

XAROPE
Benalet

bromidrato de dextrometorfano
15 mg / 5 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Com copo dosador



Elimina a Tosse Seca
uso oral

conteúdo 120 mL

XAROPE
Benalet

bromidrato de dextrometorfano
15 mg / 5 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Com copo dosador

Produto fabricado e embalado por:
McNeil LA LLC - Cali - Colômbia
Importado por:
Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.
Rod. Presidente Dutra, km 154
São José dos Campos - SP
CNPJ: 59.748.988/0001-14
Indústria Brasileira
MS - 1.5721.0010.001-1
Farmacêutica Responsável:
Fernanda P. Runha
CRF-SP nº 29.761
Serviços ao Consumidor
0800 728 6767
www.jnjbrasil.com.br

QUALIDADE
Johnson & Johnson
Ind. Ltda.

RASPE AQUI
COM OBJETO
DE METAL

Código de Barras
7891010803797

Lote nº:
 Data de fabr.:
 Prazo valid.:

XAROPE
Benalet

bromidrato de dextrometorfano
15 mg / 5 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Com copo dosador



Elimina a Tosse Seca
uso oral

conteúdo 120 mL

Composição: 15 mg de bromidrato de dextrometorfano a cada 5 mL.

Excipientes: carmelose sódica, glicerol, poloxamer, ácido cítrico, citrato de sódio, sacarina sódica diidratada, mentol, polissorbato, sorbitol, glicirrizinato de amônio, aroma artificial de framboesa, benzoato de sódio, aroma de caramelo, corantes vermelhos e água purificada.

DOSES	
Crianças de 2 a 5 anos 2,5 mL a cada 6-8 horas	 2,5 mL
Crianças de 6 a 12 anos 5 mL a cada 6-8 horas	 5 mL
Adultos e crianças maiores de 12 anos 10 mL a cada 6-8 horas	 10 mL
1 colher de chá = 5 mL	

Informações ao paciente:

Indicações: Antitussígeno. Indicado para o alívio da tosse seca, devido à irritação da garganta e brônquios que normalmente acompanha gripes e resfriados ou que está associada à inalação de agentes irritantes. **Modo de usar:** adultos e crianças maiores de 12 anos: 10 mL a cada 6-8 horas. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL a cada 6-8 horas. Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 mL a cada 6-8 horas. (1 colher de chá = 5 mL). **Contra-indicações:** em caso de hipersensibilidade a qualquer componente de sua fórmula e a crianças menores de 2 anos. **Advertências e Precauções:** consulte um médico se a tosse persistir por mais de uma semana, reincidir ou vier acompanhada de febre, erupção cutânea ou dor de cabeça persistente. Em caso de tosse crônica ou persistente, como ocorre em fumantes, em casos de asma, enfisema, bronquite, ou quando a tosse é acompanhada de quantidade excessiva de muco, não utilize o produto sem o conhecimento de seu médico. Não se recomenda utilizar o produto durante a gravidez ou lactação, a menos que recomendado por um médico. Não utilizar em caso de insuficiência respiratória ou quando haja risco da mesma. Não exceder 4 doses ao dia. **Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em diabéticos.** **Reações adversas:** com pouca frequência pode ocorrer confusão mental, constipação intestinal, dor de cabeça, enjô, sonolência, dor de estômago, náuseas ou vômitos. **Interações medicamentosas:** não utilizar o produto simultaneamente com inibidores da MAO e nem até 2 semanas após a interrupção de seu uso. **Superdoses:** procurar auxílio médico. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.