

## BETA-OPHTIOLE®

metipranolol 3,0 mg/mL

**INDICAÇÕES:** É indicado para pressão intra-ocular elevada, glaucoma crônico de ângulo aberto, glaucoma afácico e tipos especiais de glaucoma (capsular, pigmentar, juvenil e hemorrágico). **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** É um líquido transparente, livre de partículas visíveis em suspensão, para uso oftálmico (colírio). Manter ao abrigo da luz e umidade. Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Evitar tocar a ponta do frasco conta-gotas para reduzir os riscos de contaminação do produto. Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 30 dias. Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto, e aguardar de 5 a 10 minutos antes de recolocá-las. Este medicamento é contra-indicado na faixa etária infantil.

**REAÇÕES ADVERSAS:** No início pode ocorrer dor de cabeça. Ocasionalmente, uma sensação de ardência passageira pode ocorrer após a instilação. Secreção lacrimal reduzida, diminuição da sensibilidade corneal. Uveíte reversível é raramente observada. Devido à um possível aumento na resistência das vias aéreas, pacientes predispostos à reações broncoespásticas podem experimentar dispnéia. Beta-bloqueadores podem induzir bradicardia, inibir a secreção de insulina em diabéticos. **POSOLOGIA:** Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota no saco conjuntival duas vezes ao dia. **CONTRA-**

**INDICAÇÕES:** Asma brônquica, doenças pulmonares obstrutivas, hiperreatividade brônquica, insuficiência cardíaca descompensada, bradicardia, distúrbios no sistema de condução cardíaco, processos distróficos da córnea. Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Efeitos aditivos podem ocorrer com outros beta-bloqueadores, derivados da adrenalina, mióticos e inibidores da anidrase carbônica. Reg. MS - 1.1961.0002

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Data de impressão das peças publicitárias.

