

BIOPLUS[®] GINSENG HERTZ[®] Panax ginseng 80mg

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cápsulas: embalagens com 30 ou 60 cápsulas.

USO ORAL / USO INTERNO

USO ADULTO

Composição:

Cada cápsula contém:

Extrato seco padronizado da raiz de *Panax ginseng*

C.A.Meyer. com 27%* de ginsenosídeo 80 mg

Excipiente q.s.p. 1 cápsula

Excipiente: estearato de magnésio, silicato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício.

*equivalente a 21,6 mg de ginsenosídeos totais.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

BIOPLUS GINSENG é um medicamento fitoterápico obtido a partir das raízes de *Panax ginseng* C. A. Meyer. O Ginseng age como adaptógeno ou agente antiestresse. Ele melhora a capacidade de trabalho (ação estimulante) aumentando a resistência não específica do organismo às influências externas, e também o nível geral da atividade celular evidenciado pelo aumento acentuado da capacidade física e mental.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

BIOPLUS GINSENG é indicado nos estados de fadiga física e mental e como adaptógeno nas situações de stress acentuado.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-Indicações: O produto não deve ser usado por pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula. Em casos de hiperestrogenia, hipertensão, taquicardia, insônia, síndromes febris. Como o Ginseng contém pequenas quantidades de estrona, estradiol e estriol, pode ocorrer a aparição de ginecomastia ou galactorréia. Hipertensos agudos devem tomar precauções pois o Ginseng pode elevar a pressão. A dose diária não deve ultrapassar 1 cápsula ao dia. Não é recomendada sua utilização durante a gravidez e lactação por ser estimulante e conter estrogênicos em sua composição.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE OCORRER GRAVIDEZ OU INICIAR AMAMENTAÇÃO DURANTE O USO DESTE MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NA FAIXA ETÁRIA DE 0-12 ANOS.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTA FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A experiência clínica sugere que a dose de 5 mg a 30 mg de ginsenosídeos totais (equivalente a 1 cápsula) do BIOPLUS GINSENG é eficaz, segura e bem tolerada.

Adultos: uma cápsula ao dia, antes ou após as refeições. As cápsulas são mais facilmente ingeridas com algum líquido. Recomenda-se em geral manter o tratamento por 4 a 8 semanas. O uso contínuo não deve exceder a três meses.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

A CÁPSULA NÃO PODE SER PARTIDA OU MASTIGADA.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Podem ocorrer raros casos de reações gastrointestinais leves e transitórias (como náusea, dor de estômago e diarreia matinal) e insônia, possivelmente relacionados ao Ginseng. Além disso, relataram-se raros casos de reações alérgicas.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

A síndrome de abuso do Ginseng pode ser detectada pelos sintomas de: insônia, nervosismo, euforia, diarreia matinal, e erupções cutâneas. O paciente deve suspender o uso e procurar um médico.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? Conservar na embalagem original. Manter em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

290506

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

BIOPLUS GINSENG é um medicamento fitoterápico que contém o extrato padronizado de *Panax ginseng* obtido a partir de raízes da planta *Panax ginseng* C. A. Meyer. Os ginsenosídeos são considerados os responsáveis pela maioria das atividades farmacológicas do Ginseng. O extrato padronizado de *Panax ginseng* aumenta o nível geral da atividade celular, o que se evidencia pelo aumento acentuado da capacidade mental e física. Com base em suas propriedades farmacológicas, os extratos de Ginseng têm sido classificados como uma nova classe de compostos conhecidos como adaptógenos ou agentes antiestresse.

RESULTADOS DE EFICÁCIA

Em experimentos animais, verificou-se diminuição da concentração de ácido láctico nos músculos durante exercícios físicos, após o tratamento. Observaram-se aumento das quantidades de dopamina e noradrenalina e redução da quantidade de serotonina no cérebro. Os estudos farmacocinéticos são muito difíceis de realizar, uma vez que o extrato padronizado de *Panax ginseng* é um extrato complexo contendo mais de 200 substâncias diferentes identificadas. Contudo, os estudos farmacocinéticos de ginsenosídeos individuais purificados foram realizados em várias espécies de animais. Determinou-se uma biodisponibilidade de 30% em camundongos utilizando-se ginsenosídeo Rg1 proveniente do extrato padronizado G115 de *Panax ginseng*, marcado radioativamente com ¹⁴C. Dependendo da espécie animal testada e do tipo de ginsenosídeo, determinaram-se meias-vidas de 27 minutos (ginsenosídeo Rg1) e 14,5 horas (ginsenosídeo Rb1) após administração intraperitoneal.

INDICAÇÕES

Estado de fadiga física e mental, adaptógeno ou agente antiestresse.

CONTRA-INDICAÇÕES

Casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Gravidez. Hipertensão aguda.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

Conservar na embalagem original. Manter em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz e umidade.

POSOLOGIA

A experiência clínica relatada na bibliografia sugere que a dose de 1 cápsula de BIOPLUS GINSENG é eficaz, segura e bem tolerada.

Adultos: uma cápsula ao dia, antes ou após as refeições. As cápsulas são mais facilmente ingeridas com algum líquido. Recomenda-se em geral manter o tra-

tamento por 4 a 8 semanas. Utilizar por no máximo 3 meses.

ADVERTÊNCIAS

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

Hipertensos agudos devem tomar precauções, pois o Ginseng pode elevar a pressão. Não deve ser usado durante a lactação e por pacientes diabéticos.

A dose diária não deve ultrapassar 1 cápsula ao dia.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

A sensibilidade de pacientes idosos pode ser alterada com a idade. Recomenda-se o uso sob prescrição médica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Como é um estimulante do SNC, não é recomendado seu uso concomitantemente com outras substâncias estimulantes do SNC, pois o efeito pode ser exacerbado. São relatadas interações com fármacos hormonais, hipoglicemiantes, e anticoagulantes.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Relataram-se casos raros de reações gastrointestinais leves e transitórias (como náusea, dor de estômago e diarreia matinal) e insônia, possivelmente relacionados ao ginseng. Além disso, relataram-se raros casos de reações alérgicas.

SUPERDOSE

A síndrome de abuso do ginseng pode ser detectada pelos sintomas de: insônia, nervosismo, euforia, diarreia matinal, e erupções cutâneas. O paciente deve suspender o uso e procurar um médico.

ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem original. Manter em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz e umidade.

Nº de lote, data de fabricação e validade

Vide cartucho.



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A. - Indústria e Comércio
Rua Comendador Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS
Farm. Resp.: Paula Carniel Antonio - CRF-RS 4228
30 cápsulas - Reg. M.S. nº 1.0689.0145.001-9
60 cápsulas - Reg. M.S. nº 1.0689.0145.002-7
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA

290506