

Castanha da Índia ZURITA

Extrato de *Aesculus hippocastanum* L.

FITOTERÁPICO

Parte utilizada: semente

Nomenclatura botânica

Nome científico: *Aesculus hippocastanum* L.

Nome popular: Castanha da Índia

Família: Hippocastanaceae.

Formas farmacêuticas e apresentações

Comprimidos: Cartucho com 30 comprimidos

USO ADULTO – USO ORAL

Composição:

Cada comprimido contém:

Extrato seco de *Aesculus hippocastanum* L 310 mg (equivalente a 20 mg de escina).

Excipientes: celulose microcristalina, estearato de magnésio, crospovidona e dióxido de silício.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Modo de ação: Castanha da Índia Zurita atua tonificando a parede das veias e melhorando a microcirculação venosa.

Cuidados de conservação: Este medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (15 a 30° C). Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Vide cartucho. **ATENÇÃO:** Ao adquirir o medicamento confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. Não utilize o produto fora do prazo indicado, pois pode ser ineficaz ou prejudicial a sua saúde.

Gravidez e Lactação: Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação. “Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término”. “Informar ao médico se está amamentando”. “Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista”.

Cuidados de administração: “Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.”

Interrupção do Tratamento: “Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.”

Reações adversas: Em casos isolados, alguns pacientes podem apresentar distúrbios gastrointestinais, náuseas, pruridos, distúrbios da coagulação sanguínea, espasmos musculares, tonturas, dor de cabeça e hipoglicemia. “Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.”

Ingestão concomitante com outras substâncias – Baseado em estudos animais, pode haver um efeito aditivo com medicamentos hipoglicemiantes. Teoricamente, a escina pode interferir com drogas que se ligam a proteínas como fenitoína, warfarina e amiodarona, embora não existam casos reportados.

Contra-Indicações e Precauções: Este medicamento está contra-indicado para crianças menores de 10 anos, pacientes com doença renal ou hepática prévia, nos casos de gravidez e lactação. Em caso de hipersensibilidade individual aos componentes da fórmula, descontinuar o uso e procurar orientação médica. **Atenção Diabéticos:** Este medicamento possui efeito hipoglicêmico. Pacientes que estejam fazendo uso de anticoagulantes não devem utilizar **Castanha da Índia Zurita**.

“Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.”

- **Riscos da automedicação:** "NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE".

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”

Informações Técnicas:

Características Químicas e Farmacológicas – O *Aesculus hippocastanum* através de seus constituintes, possui ação antiexsudativa demonstrada clínica e farmacologicamente em casos de insuficiência venosa crônica. Promove a tonificação das veias, diminuição da fragilidade capilar e aumento do volume de irrigação capilar.

Indicações: é indicado nos casos em que ocorre insuficiência venosa e fragilidade capilar; como varizes e seus sintomas, tais como: dor, queimação, sensação de peso e cansaço nas pernas.

Contra-indicações: Este medicamento está contra-indicado para crianças menores de 10 anos, pacientes com doença renal ou hepática prévia, hipersensibilidade individual aos componentes da fórmula, pacientes que estejam fazendo uso de anticoagulantes e nos casos de gravidez e lactação.

Precauções e advertências: Pacientes que estejam fazendo uso de anticoagulantes não devem utilizar **Castanha da Índia Zurita**. **Atenção diabéticos:** Este medicamento possui efeito hipoglicêmico. “Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista”.

Interações Medicamentosas: Baseado em estudos animais, pode haver um efeito aditivo com medicamentos hipoglicemiantes. Teoricamente, a escina pode interferir com drogas que se ligam a proteínas como fenitoína, warfarina e amiodarona, embora não existam casos reportados.

Reações Adversas: Desconforto gastrointestinal, náuseas, pruridos, distúrbios da coagulação sanguínea, espasmos musculares, tonturas, dor de cabeça e hipoglicemia.

Posologia:

Comprimido: 1 comprimido, 3 a 4 vezes ao dia: pela manhã, antes das refeições e à noite ao deitar. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e com uma quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos.

Superdosagem: Em caso de ingestão do medicamento, em doses acima das recomendadas podem ocorrer diarreia, vômito, sede intensa e vermelhidão da face, midríase, sonolência. Os primeiros socorros consistem em lavagem gástrica e intestinal, administração de sulfato de sódio ou carvão ativado.

Pacientes Idosos: não existem recomendações específicas para pacientes idosos. Os mesmos cuidados para pacientes adultos devem ser seguidos.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

“VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA”

DIZERES LEGAIS

Reg. M.S. – 1.0174.0052.001-1

Farm. Resp.: Daniela Ziolkowski CRF-SP n.º 29.486

ZURITA Laboratório Farmacêutico Ltda

Rua Domingos Graziano, 104 Araras-SP CEP:13.600-718

CNPJ n 44.211.936/0001-37 - Industria Brasileira

Atendimento ao Consumidor: 0800-17-2119

www.zurita.com.br

Daniela Ziolkowski
CRF-SP: 29.486
Responsável Técnica