

Cibalena®

ácido acetilsalicílico / paracetamol / cafeína

DOR DE CABEÇA E FEBRE

Embalagem com 48 blísteres com 4 comprimidos.

Cada comprimido contém 200 mg de ácido acetilsalicílico, 150 mg de paracetamol e 50 mg de cafeína.

Excipientes: celulose microcristalina, amido de milho, óleo de rícino e óxido de ferro amarelo.

USO ADULTO (ACIMA DE 14 ANOS)

Informações Técnicas e ao Paciente:

Cibalena® é um analgésico e antipirético indicado para o alívio da dor de cabeça, dor de dente, dores de ferimento e cirurgia, e para abaixar a febre causada por gripes e resfriados. O ácido acetilsalicílico é o principal representante do grupo dos salicilatos, que são analgésicos-antipiréticos amplamente usados. Baixam a febre por dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, aumentando a dissipaçāo do calor por transpiração. O paracetamol é um derivado do p-aminofenol que se caracteriza por seu efeito analgésico acentuado, com mecanismo de ação classicamente conhecido. A cafeína vem sendo amplamente utilizada na potencialização dos efeitos analgésicos para o tratamento da dor de cabeça, reforçando o dos demais ativos.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e proteger da umidade.

O prazo de validade está impresso na embalagem. Não utilize o medicamento com o prazo de validade vencido.

Cibalena® não deve ser utilizada durante o último trimestre de gravidez; durante os outros meses deve ser utilizada com acompanhamento médico. As mães que estejam amamentando não devem tomar **Cibalena®**. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Modo de usar: 1 a 2 comprimidos até 3 vezes ao dia, durante ou após as refeições. **Cibalena®** não deve ser utilizada continuamente por períodos prolongados ou em doses acima do recomendado, exceto quando orientado pelo médico.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: podem ocorrer alergias como coceira, vermelhidão da pele ou erupção cutânea, inchaço das mucosas ou dificuldade respiratória. Nestes casos, suspender o uso de **Cibalena®** e consultar um médico. Também podem ocorrer desconforto estomacal ou intestinal com eventual sangramento, náusea e insônia. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão com outras substâncias: consulte um médico se você estiver utilizando medicamentos anticoagulantes (do tipo cumarina), medicamentos para gota, diabetes e tuberculose, meprobamato sedativo, metotrexato, corticosteróides ou heparina.



Contra-indicações: não se deve utilizar **Cibalenaa** se você for alérgico ao ácido acetilsalicílico ou a outros medicamentos contra inflamação, ao paracetamol ou à cafeína. Não utilize **Cibalenaa** se você apresentar úlcera gástrica ou duodenal, distúrbio da coagulação sanguínea (tendência a sangramentos), problemas nas hemácias (anemia hemolítica) ou deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (doença metabólica). Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Precauções: não se recomenda o uso de **Cibalenaa** por crianças e adolescentes menores de 14 anos. Consulte um médico antes de tomar **Cibalenaa** se você tiver asma, alergias, doença renal, doença hepática ou problemas estomacais. O produto não deve ser administrado na semana que antecede cirurgias.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas:
Não são conhecidos.

Superdosagem: Em caso de superdosagem procure um médico.

Pacientes idosos: **Cibalenaa** pode ser utilizada por pacientes idosos desde que verificadas as contra-indicações e precauções descritas acima.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Reg. MS - 1.0068.0029

Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira - CRF/SP 23.873

Fabricado por:
Novartis Biociências S.A.
Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP
CNPJ: 56.994.502/0098-62
Indústria Brasileira

® = Marca Registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça.

Fabricado de acordo com o processo original de Novartis AG, Suíça; resultante da fusão de Ciba-Geigy e Sandoz.

