

# Daktarin®

## Loção Cremosa

nitrato de miconazol

### IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

#### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Loção cremosa 20 mg/g (2%) em frascos com 30 g.

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO TÓPICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada grama de loção cremosa contém 0,02 g de nitrato de miconazol.

Excipientes: ácido benzóico, água, butil-hidroxianisol, glicéridos polioxi-etilênicos glicolisados, óleo mineral, palmitato-estearato de etilenoglicol e polioxi-etileno-glicol e perfume primula.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**DAKTARIN® Loção cremosa** tem como princípio ativo o nitrato de miconazol que age contra fungos causadores de infecções na pele, inibindo uma atividade essencial das células desses fungos e provocando a sua morte. Alivia rapidamente a coceira que é um sintoma comum dessas infecções.

#### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

**DAKTARIN® Loção cremosa** é indicado para tratamento tópico de infecções de pele (dermatomycoses superficiais) e unhas (onicomicoses) causadas por fungos suscetíveis incluindo cândidas (monília). Micoses de pele, tais como: tíneas de corpo,

tíneas do pé (pé de atleta e frieira), tínea da mão (micose de mão), tínea da virilha (micose da virilha), dermatite perianal (dermatite de fraldas), pitiríase versicolor (pano branco ou micose de praia).

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Contra-indicações

Não utilize **DAKTARIN® Loção cremosa** se você tiver hipersensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou aos outros componentes da fórmula.

##### Advertências

Se ocorrer alguma reação sugerindo alergia ou irritação, o tratamento deve ser interrompido.

##### Gravidez e Amamentação

**DAKTARIN® Loção cremosa** é

pouco absorvido pelo corpo quando aplicado na pele. A excreção no leite humano de miconazol é desconhecida. Se você está grávida ou amamentando, consulte seu médico se você pode usar **DAKTARIN® Loção cremosa**.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

##### Precauções

Não utilize **DAKTARIN® Loção cremosa** na região dos olhos.

Lave bem as mãos após usar **DAKTARIN® Loção cremosa**, exceto se o tratamento for nas mãos.

Mantenha uma toalha e uma esponja para banho para uso próprio, pois isso evita a infecção de outras pessoas. Troque regularmente a roupa que fica em contato com a pele infectada para evitar a reinfecção.

##### Interações Medicamentosas

Se você utiliza anticoagulantes orais (medicamentos que "afinam" o sangue), como varfarina, consulte seu médico antes de usar **DAKTARIN® Loção cremosa**.

Os efeitos terapêuticos e adversos de outros medicamentos podem aumentar com o uso concomitante de miconazol. Consulte seu médico antes de usar **DAKTARIN®**, se você utiliza qualquer outro medicamento.

**Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.**

**Informe ao médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

#### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Aspecto Físico

A loção cremosa de **DAKTARIN®** possui cor branca e homogênea.

##### Características Organolépticas

Loção com aroma artificial de primula.



#### ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO:	BU - Daktarin Loção Cremosa
CÓDIGO:	500001431
FORMATO:	115 x 210 mm
IMPRESSÃO:	PANTONE 560
DATA:	08/01/2008

### Dosagem

**Infecções de pele:** Aplique um pouco de loção sobre as lesões, uma ou duas vezes ao dia. Friccione a loção na pele com os dedos até que tenha penetrado completamente. A duração da terapia varia de 2 a 6 semanas dependendo da localização e gravidade da lesão. O tratamento deve continuar ao menos uma semana após o desaparecimento de todos os sinais e sintomas.

**Infecções de unha:** As unhas infectadas devem ser cortadas tão curtas quanto possível. Uma porção da loção deve ser aplicada e friccionada sobre e abaixo da unha infectada e também na área próxima, uma a duas vezes ao dia. A unha tratada deve ser coberta com um curativo oclusivo. O tratamento não deve ser descontinuado até que uma nova unha cresça e a cura definida possa ser observada (raramente ocorre em menos de 3 meses).

### Como Usar

Lave e seque bem o local infectado. Aplique **DAKTARIN®** gentilmente na pele com a ponta dos dedos. Não trate apenas a pele infectada, aplique o produto também na área ao redor.

Se a área infectada não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação da loção. Isto é muito importante para evitar a transferência dos germes da pele infectada para outras partes do corpo ou para outras pessoas.

Para um tratamento bem sucedido, aplique **DAKTARIN® Loção cremosa** todo dia. Não pare de usar o medicamento até uma semana após o desaparecimento dos sintomas. Dependendo do tipo e extensão da infecção, o tratamento pode durar de 2 a 6 semanas.

**Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.**

**Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

**DAKTARIN® Loção cremosa** é geralmente bem tolerado. Em casos raros, vermelhidão, irritação, leve sensação de queimação ou coceira podem acontecer no local de aplicação do **DAKTARIN® Loção cremosa**. Em tais casos,

geralmente é suficiente evitar uma ou algumas aplicações.

Hipersensibilidade (alergia) ao **DAKTARIN®** é muito rara e pode ser reconhecida por coceira, vermelhidão, respiração curta e/ou inchaço do rosto após aplicação. Nesses casos pare o tratamento e consulte seu médico.

Não hesite em relatar qualquer outro efeito indesejável ao seu médico.

### O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Quando o uso de **DAKTARIN®** é mais freqüente do que o prescrito, pode ocorrer vermelhidão, inchaço ou sensação de queimação.

Neste caso, é suficiente evitar a utilização por uma ou duas aplicações e após, voltar a utilizar **DAKTARIN®**, de acordo com o esquema prescrito.

A ingestão acidental de pequena quantidade de **DAKTARIN®** normalmente não faz mal. Contudo, para ter certeza que não há problemas, consulte seu médico.

### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

**DAKTARIN® Loção cremosa** deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), mantendo o frasco devidamente fechado.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### DIZERES LEGAIS

MS-1.1236.0024

Farmacêutico Responsável:

Marcos R. Pereira - CRF/SP nº 12304

### JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Rodovia Presidente Dutra, km 154

São José dos Campos - SP

CNPJ 51.780.468/0002-68

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Lote, Data de Fabricação e Validade: Vide Cartucho.

Não há direitos de patente concedidos nos Estados Unidos. No United States patent rights are granted.



500001431

© J-C 2007

 **JANSSEN-CILAG**  
FARMACÊUTICA