



Dimezin[®]

simeticona



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Cápsula gelatinosa mole 125mg

Embalagens contendo 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 200 e 500 cápsulas.

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

simeticona.....125mg

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento: Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole atua no estômago e no intestino rompendo ou dificultando a formação de bolhas gasosas que retêm os gases e que provocam flatulência e dores. Ao se tornarem livres, os gases são facilmente eliminados.

Indicações do medicamento: Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, e pode provocar incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.



Riscos do medicamento:

CONTRAINDICAÇÕES: VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR DIMEZIN[®] SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO USE DIMEZIN[®] SE VOCÊ APRESENTAR ALGUM DOS SINTOMAS ABAIXO: DISTENSÃO ABDOMINAL GRAVE; CÓLICA GRAVE, SENSIBILIDADE EXACERBADA À DOR (MAIS QUE 36 HORAS) E MASSA ABDOMINAL PALPÁVEL.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: COMO DIMEZIN[®] É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO. NÃO EXCEDA A DOSE RECOMENDADA.

Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações de Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole com outros medicamentos ou alimentos.

Uso durante a Gravidez e Amamentação: Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Modo de uso: Ao utilizar Dimezin[®], você deve engolir a cápsula, e não mastigá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir.

Aspecto físico: Cápsula gelatinosa mole de cor verde.

Características Organolépticas: As cápsulas de Dimezin[®] não apresentam características organolépticas marcantes que permitam sua diferenciação em relação a outras cápsulas.



Posologia: Você pode usar Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário.

Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de Dimezin[®] por dia.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS: DIMEZIN[®] NÃO É ABSORVIDO PELO ORGANISMO, ATUANDO SOMENTE DENTRO DO APARELHO DIGESTIVO, E É TOTALMENTE ELIMINADO NAS FEZES, SEM ALTERAÇÕES. ASSIM, NÃO COSTUMA PROVOCAR REAÇÕES INDESEJÁVEIS NO ORGANISMO. PODE OCORRER ECZEMA DE CONTATO E EM CASOS RAROS, REAÇÕES IMEDIATAS COMO URTICÁRIA E BRONCOESPASMO.

Conduta em caso de superdose: Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo.

Caso você, acidentalmente, use Dimezin[®] cápsula gelatinosa mole em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.



Cuidados de conservação e uso: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORADO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas: A simeticona é um silicone antiespumante, que apresenta ação antiflatulenta, aliviando o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases.

Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos médicos na prática diária é o das queixas sobre excessos de gases intestinais e a distensão abdominal por eles causada, devido à aerofagia.

A simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

Indicações: Dimezin® cápsula gelatinosa mole é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, e pode provocar incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Dimezin® cápsula gelatinosa mole também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

CONTRAINDICAÇÕES: NÃO DEVE UTILIZAR DIMEZIN® SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO USE SIMETICONA SE APRESENTAR ALGUM DOS SINTOMAS ABAIXO: DISTENSÃO ABDOMINAL GRAVE; CÓLICA GRAVE, SENSIBILIDADE EXACERBADA À DOR (MAIS QUE 36 HORAS) E MASSA ABDOMINAL PALPÁVEL.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Posologia: Você pode usar Dimezin® cápsula gelatinosa mole 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário.

Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de Dimezin® por dia.

ADVERTÊNCIAS: COMO DIMEZIN® É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO. NÃO EXCEDA A DOSE RECOMENDADA.

Uso durante a Gravidez e Amamentação: Dimezin® cápsula gelatinosa mole não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Dimezin® cápsula gelatinosa mole é contraindicado para pacientes pediátricos.

Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações de Dimezin® com outros medicamentos ou alimentos.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS: A

SIMETICONA É FISIOLÓGICAMENTE INERTE E DESPROVIDA DE TOXICIDADE. APÓS ADMINISTRAÇÃO ORAL, A SIMETICONA É ELIMINADA PELAS FEZES DE FORMA INALTERADA. PODE OCORRER ECZEMA DE CONTATO E EM CASOS RAROS, REAÇÕES IMEDIATAS COMO URTICÁRIA E BRONCOESPASMO.

Superdose: Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de Dimezin®, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo. Caso você, acidentalmente, use Dimezin® em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

Armazenagem: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

Nº do lote e data de fabricação: VIDE CARTUCHO

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659

M.S. nº 1.0370.0208

Fabricado por:

COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ – 00.413.925/0001-64

Estrada dos Estudantes, Nº 349 – Bairro Rio Cotia
CEP 06707-050 – Cotia – SP
Indústria Brasileira

Registrado por:

**LABORATÓRIO
TEUTO BRASILEIRO S/A.**

CNPJ - 17.159.229/0001-76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira



403081/01