



# Dimezin<sup>®</sup> Max



simeticona

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

### Cápsula gelatinosa mole 125mg

Embalagens contendo 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 200 e 500 cápsulas.

## USO ADULTO

### USO ORAL

## COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

simeticona.....125mg

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação do medicamento:** Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole atua no estômago e no intestino rompendo ou dificultando a formação de bolhas gasosas que retêm os gases e que provocam flatulência e dores. Ao se tornarem livres, os gases são facilmente eliminados.

**Indicações do medicamento:** Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, e pode provocar incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Dimezin<sup>®</sup> Max também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

### **Riscos do medicamento:**



**CONTRAINDICAÇÕES:** VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR DIMEZIN<sup>®</sup> MAX CÁPSULA GELATINOSA MOLE SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO USE DIMEZIN<sup>®</sup> MAX SE VOCÊ APRESENTAR ALGUM DOS SINTOMAS ABAIXO: DISTENSÃO ABDOMINAL GRAVE; CÓLICA GRAVE, SENSIBILIDADE EXACERBADA À DOR (MAIS QUE 36 HORAS) E MASSA ABDOMINAL PALPÁVEL.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** COMO DIMEZIN<sup>®</sup> MAX É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO. NÃO EXCEDA A DOSE RECOMENDADA.

**Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações de Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole com outros medicamentos ou alimentos.

**Uso durante a Gravidez e Amamentação:** Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Modo de uso:** Ao utilizar Dimezin<sup>®</sup> Max, você deve engolir a cápsula, e não mastigá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir.

**Aspecto físico:** Cápsula gelatinosa mole de cor verde.

**Características Organolépticas:** As cápsulas de Dimezin<sup>®</sup> Max não apresentam características organolépticas marcantes que permitam sua



diferenciação em relação a outras cápsulas.

**Posologia:** Você pode usar Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário.

Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de Dimezin<sup>®</sup> Max por dia.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

**Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.**

**Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).

**Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**REAÇÕES ADVERSAS:** DIMEZIN<sup>®</sup> MAX NÃO É ABSORVIDO PELO ORGANISMO, ATUANDO SOMENTE DENTRO DO APARELHO DIGESTIVO, E É TOTALMENTE ELIMINADO NAS FEZES, SEM ALTERAÇÕES. ASSIM, NÃO COSTUMA PROVOCAR REAÇÕES INDESEJÁVEIS NO ORGANISMO. PODE OCORRER ECZEMA DE CONTATO E EM CASOS RAROS, REAÇÕES IMEDIATAS COMO URTICÁRIA E BRONCOESPASMO.

**Conduta em caso de superdose:** Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de Dimezin<sup>®</sup> Max cápsula gelatinosa mole, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo.

Caso você, acidentalmente, use Dimezin<sup>®</sup> Max em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.



**Cuidados de conservação e uso:** DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DALUZ E UMIDADE. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORADO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

**Características farmacológicas:** A simeticona é um silicone antiespumante, que apresenta ação antiflatulenta, aliviando o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases.

Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos médicos na prática diária é o das queixas sobre excessos de gases intestinais e a distensão abdominal por eles causada, devido à aerofagia.

A simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

**Indicações:** Dimezin® Max é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, e pode provocar incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Dimezin® Max também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

**CONTRAINDICAÇÕES:** NÃO DEVE UTILIZAR

DIMEZIN® MAX SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO USE SIMETICONA SE APRESENTAR ALGUM DOS SINTOMAS ABAIXO: DISTENSÃO ABDOMINAL GRAVE; CÔLICA GRAVE, SENSIBILIDADE EXACERBADA À DOR (MAIS QUE 36 HORAS) E MASSA ABDOMINAL PALPÁVEL.

**Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto:** DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DALUZ E UMIDADE.

**Posologia:** Você pode usar Dimezin® Max 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário.

Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de Dimezin® Max por dia.

**ADVERTÊNCIAS:** COMO DIMEZIN® MAX É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO. NÃO EXCEDA A DOSE RECOMENDADA.

**Uso durante a Gravidez e Amamentação:** Dimezin® Max cápsula gelatinosa mole não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:** Dimezin® Max cápsula gelatinosa mole é contraindicado para pacientes pediátricos.

**Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações de Dimezin® Max com outros medicamentos ou alimentos.

**REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS:** A SIMETICONA É FISIOLÓGICAMENTE INERTE E

DESPROVIDA DE TOXICIDADE. APÓS ADMINISTRAÇÃO ORAL, A SIMETICONA É ELIMINADA PELAS FEZES DE FORMA INALTERADA. PODE OCORRER ECZEMA DE CONTATO E EM CASOS RAROS, REAÇÕES IMEDIATAS COMO URTICÁRIA E BRONCOESPASMO.

**Superdose:** Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de Dimezin® Max pois este medicamento não é absorvido pelo organismo.

Caso você, acidentalmente, use Dimezin® Max em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

**Armazenagem:** DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

Nº do lote e data de fabricação: VIDE CARTUCHO

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva  
CRF-GO nº 2.659

**M.S. nº 1.0370.0208**

**Fabricado por:**  
COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ – 00.413.925/0001-64  
Estrada dos Estudantes, Nº 349 – Bairro Rio Cotia  
CEP 06707-050 – Cotia – SP  
Indústria Brasileira

**Registrado por:**  
**LABORATÓRIO**  
**TEUTO BRASILEIRO S/A.**

CNPJ - 17.159.229/0001-76  
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA  
CEP 75132-140 - Anápolis - GO  
Indústria Brasileira



**SAC**teuto  
0800621800  
sac@teuto.com.br

403190/02