

Diupress®

clortalidona
cloridrato de amilorida

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimido - Embalagem com 20 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

clortalidona	25 mg
cloridrato de amilorida	5 mg
Excipientes q.s.p.	1 comprimido
Excipientes - Lactose, estearato de magnésio, talco, amido e corante.	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

O Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida) aumenta a excreção renal de água, sódio e cloro, sem determinar sobrecarga circulatória. O efeito diurético tem início em cerca de 2 horas e alcança seu máximo após 12 horas, persistindo por 1 ou 2 dias.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco e ao abrigo da umidade.

PRAZO DE VALIDADE

Desde de que observados os devidos cuidados de

armazenamento, o prazo de validade do produto é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

ATENÇÃO:

O PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO FORA DO PRAZO DE VALIDADE INDICADO, SOB RISCO DE NÃO PRODUZIR OS EFEITOS ESPERADOS.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Como outros diuréticos, o uso de Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida), durante a gravidez, deverá ser avaliado cuidadosamente pelo médico. Como a clortalidona passa para o leite, as mães que estiverem usando Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida), não deverão amamentar. Informar ao médico ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

Os comprimidos deverão ser deglutidos com um pouco de líquido por ocasião do jejum. Para obter o máximo de eficácia utilize a medicação no horário e dose exata estipulada pelo seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe ao seu médico o aparecimento de qualquer reação desagradável, tais como: erupção cutânea, sede intensa ou intensa fadiga.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

Durante o tratamento com Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida), aconselha-se alimentação rica em verduras e frutas (especialmente frutas cítricas, banana, suco de tomate e melão).

Em casos de anúria. Também não deve ser indicado em portadores de taxas altas de potássio no soro, assim como em portadores de nefropatia grave ou de insuficiência renal

aguda e em indivíduos com reconhecida sensibilidade a amilorida ou a clortalidona. Não deve ser usado nos 3 primeiros meses de gravidez.

A clortalidona provoca aumento das taxas de ácido úrico e das taxas glicêmicas, devendo ser administrada, com cuidados especiais, a pacientes com gota ou diabetes.

Gravidez e lactação: Durante a gravidez o Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida), pode, como outros diuréticos, reduzir o volume plasmático, assim como irrigação útero placentária, devendo por essa razão ser ponderado cuidadosamente o seu emprego em mulheres grávidas. No caso de eclâmpsia ou pré eclâmpsia, os diuréticos deverão ser usados somente sob estrita supervisão médica, considerando os benefícios em relação ao risco potencial. Como a clortalidona passa para o leite, as mães que estiverem usando Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida), não deverão amamentar. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.


ESTE PRODUTO CONTÉM O CORANTE AMARELO DE TARTRAZINA QUE PODE CAUSAR REAÇÕES DE NATUREZA ALÉRGICA, ENTRE AS QUAIS ASMA BRÔNQUICA, ESPECIALMENTE EM PESSOAS ALÉRGICAS AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.

NÃO TOMA REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida) é uma associação de um diurético benzodiazepínico à clortalidona cuja fórmula é:



e o cloridrato de amilorida que é pirazinoil-guanidina, cuja fórmula é:



A clortalidona, diurético de ação prolongada, com excelente efeito hipotensor, é a droga recomendada na literatura como primeiro, e na grande maioria das vezes, único fármaco a ser utilizado no tratamento da hipertensão arterial de qualquer etiologia. A associação de clortalidona a amilorida, constante no Diupress® (clortalidona + cloridrato de amilorida) contorna o principal inconveniente do uso da clortalidona a longo prazo, ou seja, o surgimento da hipopotassemia. Assim, a amilorida evita a troca de sódio por potássio no túbulo renal, impede a perda excessiva de potássio e reforça a desejada ação natriurética, reforçando o efeito hipotensor da clortalidona.

INDICAÇÕES

Casos de hipertensão arterial de qualquer etiologia.

CONTRA-INDICAÇÕES

EM CASOS DE ANÚRIA. TAMBÉM NÃO DEVE SER INDICADO EM PORTADORES DE TAXAS ALTAS DE POTÁSSIO NO SORO, ASSIM COMO EM PORTADORES DE NEFROPATIA GRAVE OU DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E EM INDIVÍDUOS COM RECONHECIDA SENSIBILIDADE A AMILORIDA OU A CLORTALIDONA. NÃO DEVE SER USADO NOS 3 PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ.

PRECAUÇÕES

A CLORTALIDONA PROVOCA AUMENTO DAS TAXAS DE ÁCIDO ÚRICO E DAS TAXAS GLICÊMICAS, DEVENDO SER ADMINISTRADA, COM CUIDADOS ESPECIAIS, A PACIENTES COM GOTA OU DIABETES.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: DURANTE A GRAVIDEZ O DIUPRESS® (CLORTALIDONA + CLORIDRATO DE AMILORIDA), PODE, COMO OUTROS DIURÉTICOS, REDUZIR O VOLUME PLASMÁTICO, ASSIM COMO IRRIGAÇÃO ÚTERO PLACENTÁRIA, DEVENDO POR ESSA RAZÃO SER PONDERADO CUIDADOSAMENTE O SEU EMPREGO EM MULHERES GRÁVIDAS. NO CASO DE ECLÂPSIA OU PRÉ ECLÂPSIA, OS DIURÉTICOS DEVERÃO SER USADOS SOMENTE SOB ESTRITA SUPERVISÃO MÉDICA, CONSIDERANDO OS BENEFÍCIOS EM RELAÇÃO AO RISCO POTENCIAL. COMO A CLORTALIDONA PASSA PARA O LEITE, AS MÃES QUE ESTIVEREM USANDO DIUPRESS® (CLORTALIDONA + CLORIDRATO DE AMILORIDA), NÃO DEVERÃO AMAMENTAR.

ESTE PRODUTO CONTÉM O CORANTE AMARELO DE TARTRAZINA QUE PODE CAUSAR REAÇÕES DE NATUREZA ALÉRGICA, ENTRE AS QUAIS ASMA BRÔNQUICA, ESPECIALMENTE EM PESSOAS ALÉRGICAS AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

EM PACIENTES SOB TRATAMENTO COM LÍTIO A ADMINISTRAÇÃO DE DIURÉTICOS SOMENTE SERÁ FEITA COM CUIDADO PORQUE PODEM REDUZIR A EXCREÇÃO DE LÍTIO, AUMENTANDO OS SEUS NÍVEIS SÉRICOS. NOS PACIENTES COM POLIÚRIA INDUZIDA PELO LÍTIO, FOI OBSERVADO UM EFEITO ANTIDIURÉTICO PARADOXAL, QUANDO DO USO SIMULTÂNEO DE DIURÉTICOS.

REAÇÕES ADVERSAS

PODEM OCORRER REAÇÕES DESAGRADÁVEIS, TAIS COMO: ERUPÇÃO CUTÂNEA, SEDE INTENSA OU INTENSA FADIGA.

POSOLOGIA

Normalmente 1 comprimido diariamente, podendo, em casos rebeldes, utilizar-se 2 comprimidos ao dia. Esta posologia pode ser modificada de acordo com o critério médico.

SUPERDOSAGEM

Sintomas de superdosagem inclui: náuseas,

fraqueza, tontura, distúrbios no equilíbrio eletrolítico. Como não existe antídoto específico deverá ser feita lavagem gástrica e tratamento de suporte. Quando necessário, deverá ser incluída glicose endovenosa, soro com potássio se for o caso, mas sempre com muito cuidado.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e validade:
VIDE CARTUCHO

Para sua segurança, mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.

MS - 1.0043.0981

Farm. Resp.:
Dra. Sônia Albano Badaró - CRF-SP 19.258



EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.
Av. Ver. José Diniz, 3.465
São Paulo - SP
CNPJ 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira

