

Dórico (Sanofi-Aventis).

Paracetamol

Composição

DÔRICO Gotas: Paracetamol 200 mg/ml (1 ml = 20 gotas). DÔRICO 500 mg: Paracetamol 500 mg/comprimido. DÔRICO 750 mg: Paracetamol 750 mg/comprimido. DÔRICO Chá: Paracetamol 500 mg/envelope.

Indicações

Analgésico e antitérmico.

Contra-indicações

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. O uso prolongado de altas doses de paracetamol pode aumentar o risco de lesão hepatocelular em alcoólatras ou em pacientes sob tratamento com medicamentos hepatotóxicos ou indutores de enzimas hepáticas. Pacientes com insuficiência hepática, hepatite viral ou disfunção renal grave devem ser tratados com cautela. Intereage com anticoagulantes cumarínicos e cloranfenicol. Evitar o uso concomitante com substâncias que inibem o esvaziamento gástrico e produtos hepatotóxicos, inclusive o álcool. O paracetamol pode falsear o resultado de alguns exames laboratoriais, tais como: glicemia (testes em fitas reagentes), testes de função pancreática e uricemia.

Reações adversas

O uso prolongado do paracetamol em altas doses pode provocar disfunção hepática e discrasias sangüíneas. Erupções cutâneas, urticária e outras reações de hipersensibilidade podem ocorrer com o uso do produto.

Posologia

DÔRICO Gotas: *Crianças*: 1 gota por quilo de peso, até o limite de 35 gotas por dose. Essa dose pode ser repetida até 5 vezes ao dia. *Crianças com mais de 12 anos e adultos*: 35 a 55 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. DÔRICO 500 mg: 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia. *Crianças com mais de 30,5 kg*: 1 comprimido a cada 4 horas. DÔRICO 750 mg: 1 comprimido, 3 a 4 vezes ao dia. DÔRICO Chá: *Crianças com mais de 12 anos e adultos*: 1 sachê a cada 4 ou 6 horas. *Crianças com menos de 12 anos*: Seguir orientação médica. *Modo de usar*: Diluir o conteúdo do sachê em água quente. Não é preciso adoçar. Beber enquanto quente.

Apresentações

DÔRICO Gotas: Frasco com 15 ml. DÔRICO 500 mg: Cartucho com 100 comprimidos. DÔRICO 750 mg: Cartuchos com 10, 20 ou 200 comprimidos. DÔRICO Chá: Caixa contendo 50 envelopes. Cada envelope contém 5 g de pó para dissolução.