


# COMO USAR Duofilm®

1.



Lave cuidadosamente a área afetada com água morna durante cinco minutos, no mínimo, e seque cuidadosamente com uma toalha limpa.

2.



Faça um orifício central, do tamanho da verruga, em um pedaço de esparadrapo.

3.



Aplique o esparadrapo sobre a verruga, de modo que só a verruga fique visível e a área ao redor da mesma esteja protegida.

4.



Aplique **Duofilm®** diariamente, de preferência à noite, sobre a verruga com o pincel aplicador, e espere secar. Repita a operação por mais três vezes. Evite o contato do produto com a pele sã.

5.



Quando **Duofilm®** estiver completamente seco sobre a verruga, recomenda-se cobrir a mesma com um esparadrapo ou curativo adesivo.

Troque o curativo a cada 24 horas, tomando o cuidado de repetir todos os procedimentos passo a passo.

#### PRECAUÇÕES:

Não use o produto se você for diabético ou tiver problemas circulatórios.  
Não aplique na face ou mucosas (órgãos genitais, olhos, boca e narinas).

**ALTAMENTE INFLAMÁVEL - MANTENHA LONGE DO FOGO E DE CHAMAS.  
MANTER O FRASCO FIRMEMENTE FECHADO, NÃO AGITE O FRASCO.**

**Laboratórios Stiefel Ltda**  
R. Prof. João C. Salem, 1081/1301  
Guarulhos - SP  
CNPJ 63.064.653/0001-54  
Indústria Brasileira  
0715 000

Reg. MS 1.0675.0004  
Farm. Resp.: Waldir A. K. Bonetti  
CRF-SP 12381

SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
 **0800 7043189**  
e-mail: [sac@stiefel.com.br](mailto:sac@stiefel.com.br)  
[www.stiefel.com.br](http://www.stiefel.com.br)

043B3



## COMUNICADO

Prezado Consumidor,

A **STIEFEL®** sempre buscando o que há de melhor para seus consumidores, comunica que o **Duofilm®** foi submetido a um processo de modernização e apresenta agora uma nova embalagem: **as informações do rótulo estão sendo gravadas diretamente no frasco e por esse motivo o antigo rótulo foi retirado.**

O produto não sofreu nenhum tipo de alteração em sua fórmula e continua sendo fabricado seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade, garantindo a eficácia e segurança já conhecidas pela comunidade médico-científica.

Para quaisquer esclarecimentos, colocamo-nos à disposição através do **0800 704 31 89** ou e-mail [sac@stiefel.com.br](mailto:sac@stiefel.com.br)

Atenciosamente,  
**Laboratórios Stiefel Ltda.**

 Preto



# Duofilm®

**ácido salicílico 165,0 mg/ml**  
**ácido láctico 145,2 mg/ml**  
colóidio lacto-salicilado

Apresentação: frasco plástico contendo 15 ml  
**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**  
**USO EXTERNO**

#### COMPOSIÇÃO:

ácido salicílico .....	165,0 mg
ácido láctico .....	145,2 mg
excipiente q. s. p. ....	1,0 ml

O excipiente contém: colóidio elástico, éter etílico e álcool etílico.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: pode-se observar a ação do produto nas primeiras duas a quatro semanas de tratamento, sendo que a cura total pode ser esperada após seis a doze semanas de aplicação do **Duofilm**®.

**Duofilm**® é altamente inflamável e deve ser mantido longe do fogo ou de chamas. Manter o frasco firmemente fechado quando não estiver em uso. Não agite o frasco. Armazenar o produto à temperatura ambiente (15 - 30°C). Proteger da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

#### O que é uma verruga?

Uma verruga é um crescimento da pele causado por infecção viral. É importante que seja tratada rapidamente, pois é contagiosa, elas podem passar de uma pessoa para outra, ou de uma parte para outra do corpo.



#### Como reconhecer uma verruga:

Verrugas comuns são pequenas, arredondadas com superfície áspera, com aspecto de couve-flor. Elas são frequentemente castanho-avermelhadas e geralmente aparecem nos dedos ou mãos.

**“NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PODE SER PREJUDICIAL PARA SUA SAÚDE”.**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

O produto não deve ser usado durante a gravidez e a amamentação.

**“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.**

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, como irritação local acompanhada de sensação de queimação e formação de crostas. Estes sintomas podem ser controlados pela suspensão temporária da terapia. Outras reações adversas, muito raras, incluem dermatite e toxicidade sistêmica aguda por salicilato.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.**

Não utilizar ao mesmo tempo **Duofilm**® e outros produtos nas áreas que estão sendo tratadas, como por exemplo agentes descamantes, produtos anti-acne, produtos contendo álcool, sabonetes abrasivos, cosméticos e sabonetes de ação secativa, cosméticos medicamentosos ou outras medicações tóxicas, a não ser que seja sob orientação médica. Deve-se interromper o tratamento, caso ocorra irritação excessiva.

O produto é contra-indicado para pacientes diabéticos, com problemas circulatórios, com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou ácido láctico, como também não deve ser aplicado sobre pintas ou marcas de nascença (com ou sem pêlos).

**Duofilm**® não deve ser aplicado na pele normal que circunda a verruga pois provoca uma reação irritante local. Esta irritação é controlada com a suspensão temporária do tratamento e pela aplicação do produto somente na verruga. Caso a irritação persista, consulte o seu médico.

Não utilizar o produto sobre a pele irritada, inflamada ou infeccionada.

O produto não deve ser aplicado na face e nas mucosas (órgãos genitais, olhos, boca e narinas). Se ocorrer contato com essas áreas, lavar abundantemente com água, até a remoção do produto e continuar a lavar por mais 15 minutos.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Ação farmacológica:** o exato modo de ação do ácido salicílico no tratamento das verrugas ainda é desconhecido. Sua atividade parece estar relacionada a sua ação queratolítica que resulta na remoção mecânica das células epidérmicas associadas com o vírus causador da verruga (HPV - papiloma vírus humano). O ácido láctico é um componente natural do líquido celular e tem ação queratolítica e emoliente, potencializando a ação do ácido salicílico.

#### INDICAÇÕES

**Duofilm**® é indicado no tratamento e remoção das verrugas comuns.

#### CONTRA-INDICAÇÕES

**Duofilm**® é contra-indicado para pacientes diabéticos, com problemas circulatórios, com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou a qualquer componente da fórmula, como também não deve ser aplicado em pintas e marcas de nascença (com ou sem pêlos).

#### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto em gestantes e mulheres no período de amamentação. Em crianças, o produto não deve ser aplicado em grandes áreas do corpo, durante longos períodos de tempo e deve-se evitar a oclusão de extensas áreas cutâneas, devido à possibilidade de grande absorção do ácido salicílico a não ser que seja sob prescrição médica. O ácido salicílico deve ser usado com cuidado em grandes áreas da pele, pois pode resultar em toxicidade sistêmica. Sua aplicação contínua e frequente na pele pode causar dermatite.

Devido a sua ação queratolítica e irritante, **Duofilm**® não deve entrar em contato com olhos, membranas mucosas e a pele sã que circunda a verruga.

**Duofilm**® não deve ser aplicado em verrugas da face e dos órgãos genitais.

#### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante de **Duofilm**® e outros produtos, como agentes descamantes, produtos utilizados no tratamento da acne (peróxido de benzoila, tretinoína, isotretinoína e outros), produtos contendo álcool, sabonetes abrasivos, cosméticos e sabonetes de ação secativa, cosméticos medicamentosos ou outras medicações tóxicas podem provocar um efeito irritativo e secativo de ação cumulativa, que podem resultar em irritação excessiva da pele.

#### REAÇÕES ADVERSAS

O uso de **Duofilm**® pode levar a irritação local, acompanhada de sensação de queimação e formação de crosta. Estes sintomas podem ser controlados pela suspensão temporária da terapia. Outras reações adversas, muito raras, incluem dermatite, devido à aplicação de ácido salicílico em grandes áreas da pele, principalmente aquelas afetadas por alguma dermatose.

#### POSOLOGIA

Antes da aplicação do **Duofilm**®, lavar a área afetada com água morna por 5 minutos, no mínimo, e secar cuidadosamente com toalha limpa. Proteger a área que circunda a verruga, aplicando um pedaço de esparadrapo, com um orifício central, do mesmo tamanho da verruga, de maneira que somente a verruga fique visível. Aplicar quatro camadas do produto diretamente sobre a verruga, uma vez ao dia, evitando contato com a pele normal que circunda a verruga. A aplicação deve ser efetuada diariamente, de preferência à noite. Quando **Duofilm**® estiver completamente seco sobre a verruga, recomenda-se cobrir a mesma com um esparadrapo ou curativo adesivo. Normalmente, observam-se os primeiros resultados após duas a quatro semanas da terapia, sendo que a cura total pode ser esperada após seis a doze semanas.

#### SUPERDOSAGEM E INGESTÃO ACIDENTAL

A ingestão acidental do produto pode produzir efeitos sistêmicos, tais como vômito, dor abdominal, aumento na frequência respiratória, acidose e distúrbios mentais. Pode provocar erupções cutâneas em indivíduos sensíveis. As medidas imediatas visam livrar o organismo rapidamente do ácido salicílico. A administração do bicarbonato de sódio é rápida e eficaz, caso possa ser produzida uma urina alcalina.

Topicamente, a superdosagem pode ocorrer devido à aplicação do produto em grandes áreas da pele, afetadas por alguma dermatose ou pelo uso contínuo e indiscriminado. Nestes casos, deve-se interromper o uso do produto.

#### PACIENTES IDOSOS

Não foram realizados, até o momento, estudos apropriados sobre os efeitos do ácido salicílico na população geriátrica. Entretanto, como doenças vasculares periféricas podem estar presentes em pacientes idosos, existe uma maior probabilidade do desenvolvimento de inflamações agudas ou ulcerações nas extremidades, quando estes são tratados com medicamentos à base de ácido salicílico.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.