

Eaca[®]

balsâmico

Ácido épsilon-aminocaproico,
benzoato de sódio, guaifenesina e
cloreto de amônio

Uso adulto e pediátrico

Forma farmacêutica e apresentação - *Xarope*: Embalagem contendo frasco com 100 ml.

Composição - Cada ml contém: Ácido épsilon-aminocaproico 25 mg; Benzoato de sódio 50 mg; Guaifenesina (éter gliceril-guaiacólico) 10 mg; Cloreto de amônio 10 mg; Veículo (sacarina, metilparabeno, essências de cereja e de framboesa, corante caramelo, sacarose e água) q.s.p. 1 ml.

Informações ao paciente - EACA[®] BALSÂMICO destina-se à expectoração e ao alívio da tosse. EACA[®] BALSÂMICO deve ser guardado na sua embalagem original, ao abrigo do calor excessivo, umidade e luz solar direta. Nestas condições, este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (ver embalagem externa). Este, como qualquer outro produto, não deve ser usado após vencido o prazo de validade ou caso suas características físicas estejam alteradas. Ao comprar um medicamento, verifique se a embalagem está íntegra. EACA[®] BALSÂMICO, assim como qualquer outro medicamento, não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação, a não ser sob estrita orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término. Para que o tratamento com EACA[®] BALSÂMICO forneça os resultados esperados, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre o modo de usar, os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Não desaparecendo os sintomas, retorne ao seu médico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Não há restrições quanto à alimentação ou outra medicação que necessite ser utilizada junto com EACA[®] BALSÂMICO. Mesmo assim, informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Não tome remédio sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Informações técnicas - EACA[®] BALSÂMICO atua, fundamentalmente, como fluidificante e expectorante das secreções brônquicas, sem interferir com o reflexo da tosse. O ácido épsilon-aminocaproico, inibidor de enzimas proteolíticas, reduz a resposta inflamatória. A guaifenesina, também denominada éter gliceril-guaiacólico, determina a produção de muco fluido, reduzindo a viscosidade, a tensão superficial e a adesividade do muco na árvore respiratória. O aumento do fluxo e a diminuição da viscosidade permitem um aumento na motilidade ciliar, facilitando a remoção do muco. O benzoato de sódio e o cloreto de amônio apresentam propriedades expectorantes aditivas às da guaifenesina, auxiliando na eliminação do excesso de muco da árvore respiratória, desta forma, facilitando a respiração.

Indicações - EACA[®] BALSÂMICO está indicado para o tratamento das afecções de natureza inflamatória do

aparelho respiratório, como fluidificante e expectorante das secreções brônquicas. Como coadjuvante no tratamento das crises asmáticas e asmátiformes.

Contraindicações - EACA[®] BALSÂMICO está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções e advertências - Durante a gravidez e a lactação, o produto deve ser utilizado sob estrita orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não se recomenda a sua utilização no primeiro trimestre da gravidez. *Atenção:* Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Interações medicamentosas - Até o momento, não foram observadas interações com outros medicamentos.

Reações adversas - Em geral, EACA[®] BALSÂMICO é muito bem tolerado, sendo a incidência de efeitos colaterais pouco frequente. Raramente podem ocorrer reações, tais como: zumbido, gastralgia, fraqueza, diarreia, náusea ou vômito.

Posologia e modo de usar - *Adultos:* 10 ml (uma colher das de sobremesa), de quatro em quatro horas, a critério médico. *Crianças de 2 até 10 anos:* 5 ml (uma colher das de chá), de quatro em quatro horas, a critério médico.

Superdosagem - Até o momento, não existem relatos de casos de superdosagem.

Pacientes idosos - Não há advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto em pacientes idosos.

Venda Sob Prescrição Médica.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-2829911 e (9-021-21) 3393-4266.

Registro no M.S. 1.0014.0018.

Química e Farmacêutica NIKKHO do Brasil Ltda.