



# GELFLEX®

 **BUNKER**

salicilato de metila  
cânfora  
mentol

---

---

## FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica: embalagem contendo uma bisnaga com 45 g.

### USO TÓPICO

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada g da pomada dermatológica contém:

salicilato de metila .....	52,50 mg
cânfora .....	44,40 mg
mentol .....	20,00 mg
excipiente q.s.p. ....	1,00 g

(essência de terebentina, essência de alfazema, essência de mostarda, essência de alecrim, petrolato branco, parafina, petrolato amarelo e polietileno).

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação esperada do medicamento:** o produto é indicado para uso exclusivamente tópico, nos casos de reumatismos, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

**Cuidados de armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), proteger da luz e umidade.

**Prazo de validade:** 24 meses a contar da data de sua fabricação.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

**Atenção: Não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.**

**Gravidez e lactação:** informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

**Cuidados de administração:** siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento.

**Interrupção do tratamento:** não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.

**Reações adversas: informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Contraindicações:** o produto é contraindicado para pacientes que apresentarem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Informe a seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**Precauções e advertências:** suspender o uso em caso de hipersensibilidade na pele.

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**





## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS

**Salicilato de metila** - Revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, invadidas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central.

**Cânfora** - Possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.

**Mentol** - Aplicado localmente causa uma sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

**Indicações:** reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

### CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pacientes que apresentarem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS.**

### PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS

Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas. Em caso de irritação, suspenda o uso.

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

### REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

### SUPERDOSAGEM

O uso excessivo não dará resultados terapêuticos melhores ou mais rápidos, podendo ocorrer irritação da pele. O produto destina-se exclusivamente a uso tópico, em caso de ingestão acidental, recomenda-se consultar o médico.

### PACIENTES IDOSOS

Não foram relatados restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores que 65 anos de idade.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Reg. MS nº 1.0577.0015

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

**Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.**

Rua Anibal dos Anjos Carvalho, 212

Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



BK03009

