



TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC ANVISA nº 199/2006.
AFE nº 1.00.440-9

Número do lote, data de fabricação e validade:
vide cartucho.
Farm. Resp.: Dra. Lauren Lobo Lustosa
CRF-SP nº 27.944



Instituto Terapêutico Delta Ltda.
Estrada do Capovilla, 129
Distrito Industrial - Indaiatuba - SP
C.N.P.J. 33.173.097/0002-74
Indústria Brasileira



Hidroxogel



hidróxido de alumínio
hidróxido de magnésio

FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: embalagem contendo um frasco com 240 mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

AGITE ANTES DE USAR

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução contém:
hidróxido de alumínio 6,0 %
hidróxido de magnésio 4,0 %
excipiente q.s.p. 1 mL
(simeticona, essência de morango, hietelose, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, sorbitol, propilenoglicol e água).

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

HIDROXOGEL age como antiácido.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

HIDROXOGEL é indicado como coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.





QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES

Recomenda-se o uso sob orientação médica.

Uso em idosos e durante a gravidez e amamentação.

Uso de acordo com critério médico.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A absorção de alguns medicamentos pode ser alterada com o uso concomitante de antiácido. Desta forma, sempre que possível, deve-se evitar a administração de outros medicamentos durante o intervalo de uma a duas horas após o uso de antiácido.

Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Características físicas e organolépticas

Verifique se o medicamento que você adquiriu possui as seguintes características:

Suspensão de coloração branca, apresentando aspecto homogêneo e odor de morango.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Uso interno. Tomar de 5 a 10mL, 4 vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

O aparecimento de reações desagradáveis em decorrência do uso do medicamento é raro, e se ocorrer, o médico deverá ser informado. Estas reações incluem diarreia e constipação.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não há relato. Caso haja superdosagem, consultar o médico imediatamente.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

HIDROXOGEL deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), proteger da luz.

