



### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Reg. MS nº 1.0440.0002

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho  
Farm. Resp.: Dra. Priscila Gomes de Paula - CRF-SP nº 32.498

#### Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129 - Distrito Industrial - Indaiatuba - SP  
C.N.P.J. 33.173.097/0002-74 - Indústria Brasileira



# NEOMICIN

sulfato de neomicina



### FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica: embalagem contendo uma bisnaga com 20 g.

### USO TÓPICO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada dermatológica contém:  
sulfato de neomicina (equivalente a 3,5 mg de neomicina base) .... 5 mg  
excipiente q.s.p. .... 1 grama  
(metilparabeno, petrolato amarelo e polietileno).

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

NEOMICIN é um anti-infeccioso tópico para uso externo e não ocular. Combate uma ampla variedade de infecções da pele.

#### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

A pomada de neomicina é indicada para o tratamento de uma ampla variedade de infecções locais, causadas por bactérias sensíveis ao antibiótico, incluindo doenças de pele infectadas, queimaduras infectadas, cortes, úlceras na pele, impetigo, furúnculos e infecção na parte de fora da orelha.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser usado por pacientes que tenham alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e a outros componentes da fórmula. Também não deve ser usado nos casos de perda da função dos rins (insuficiência renal grave) e quando

DE50371/A



o paciente já teve ou tem problemas de audição ou de equilíbrio (sistema labiríntico).

Este medicamento está contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactentes.

#### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

**Não utilize Neomicin para uso oftálmico.**

O uso em feridas profundas ou grandes extensões de queimaduras pode originar uma maior absorção da neomicina para o sangue, por isso o risco deve ser avaliado pelo médico. Nos casos em que esta absorção é muito grande, e principalmente se o paciente já tem problemas na função dos rins, ou quando ele usa outros medicamentos que podem alterar a função dos rins ou a audição, podem ocorrer eventualmente problemas nestes órgãos.

Pacientes que já usaram antibióticos aminoglicosídeos (por exemplo, a canamicina e/ou estreptomina) e aqueles que usam ao mesmo tempo Neomicin e outros antibióticos aminoglicosídeos, devem ser acompanhados pelo médico, pois pode haver uma maior chance de aparecerem efeitos colaterais.

Uso local prolongado deve ser evitado pois pode levar à sensibilização da pele e possível sensibilidade cruzada para outros aminoglicosídeos.

*Pacientes idosos:* não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso deste produto por pacientes idosos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. (Categoria de risco na gravidez: C)

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Reações de hipersensibilidade podem ocorrer com maior frequência com o uso concomitante de outros antibióticos aminoglicosídeos por via sistêmica.

**ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS PREMATURAS, RECÉM-NASCIDOS E LACTENTES.**

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO À SUA SAÚDE.**

#### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Características físicas e organolépticas:**

Pomada dermatológica de cor branca, translúcida, apresentando aspecto homogêneo.

##### **POSOLOGIA**

Aplicar sobre a região afetada uma fina camada da pomada, 1 a 3 vezes ao dia, ou a critério médico.

**Como usar:** antes de aplicar o produto, lavar a região afetada com água e sabão, e secar cuidadosamente o local. Depois da aplicação, pode-se proteger a região tratada com gaze.

\*Uso tópico. Não utilize NEOMICIN para uso oftálmico.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**SIGA A ORIENTAÇÃO DO SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.**

#### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

As reações adversas mais comuns que podem ocorrer são: coceira no local, vermelhidão, inchaço no local da aplicação e exantema.

#### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

É pouco provável que ocorra um quadro de intoxicação com o uso de NEOMICIN quando as doses e a forma de aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, caso o medicamento seja usado em quantidade excessiva, a região deve ser lavada imediatamente com água e sabão neutro, e seca com gaze ou pano limpo. Procurar assistência médica, caso apareçam reações indesejáveis.

