



AGENTES SIMPATOMIMÉTICOS, EVIDENCIADA POR SINAIS DE INSÔNIA OU VERTIGEM. NÃO DEVE SER USADO ININTERRUPTAMENTE DURANTE LONGOS PERÍODOS.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Pacientes idosos não apresentam diferença em relação aos demais pacientes. Não deve ser administrado em crianças principalmente menores de 12 anos.

Interações medicamentosas: Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase. O uso concomitante deste medicamento com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS: PODE OCORRER IRRITAÇÃO LOCAL PASSAGEIRA (QUEIMAÇÃO, ARDÊNCIA E ESPIRROS). JÁ FORAM DESCRITAS OCORRÊNCIAS DE NÁUSEA E CEFALÉIA. PACIENTES DIABÉTICOS PODEM TER O VALOR DA GLICEMIA ELEVADO COM USO CRÔNICO DA NAFAZOLINA. PACIENTES EM USO CRÔNICO DESTES PRODUTOS PODEM APRESENTAR CONGESTÃO NASAL POR EFEITO REBOTE E SEU USO PROLONGADO PODE ACARRETAR RINITE MEDICAMENTOSA.

Superdose: Nos casos de superdosagem podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaleia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

Armazenagem: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Nº do lote e data de fabricação: VIDE CARTUCHO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659
M. S. Nº 1.0370.0474

LABORATÓRIO
TEUTO BRASILEIRO S/A.

CNPJ - 17.159.229/0001-76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira



Soroliv Adulto®

cloridrato de nafazolina



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Nasal 0,5mg/mL

Embalagem contendo 01 frasco com 30mL.

USO ADULTO

USO NASAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL (33 gotas) da solução nasal contém:

cloridrato de nafazolina.....0,5mg

Veículo q.s.p.....1mL

Excipientes: cloreto de benzalcônio, cloreto de sódio, e água para injeção.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento: Soroliv Adulto® é um descongestionante nasal de uso local (mucosa do nariz), com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas).

Indicações do medicamento: Soroliv Adulto® está indicado como descongestionante de uso tópico nasal.

Riscos do medicamento:

CONTRAINDICAÇÕES: SOROLIV ADULTO® ESTÁ CONTRAINDICADO A PACIENTES QUE APRESENTAM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM CRIANÇAS PRINCIPALMENTE MENORES DE 12 ANOS E DURANTE A GRAVIDEZ. ESTE MEDICAMENTO DESTINA-SE AO USO TÓPICO NASAL, SENDO CONTRAINDICADO SEU USO EM INALOTERAPIA.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O FRASCO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DO PROCESSO INFECCIOSO. UTILIZAR COM CAUTELA EM PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES E HIPERTIREOIDISMO, *DIABETES MELLITUS*, HIPERTROFIA PROSTÁTICA E PACIENTES QUE APRESENTEM FORTE REAÇÃO A AGENTES SIMPATOMIMÉTICOS, EVIDENCIADA POR SINAIS DE INSÔNIA OU VERTIGEM. NÃO DEVE SER USADO ININTERRUPTAMENTE DURANTE LONGOS PERÍODOS.

Interações medicamentosas: Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase. O uso





concomitante deste medicamento com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Este medicamento é contraindicado na faixa etária de 0 a 12 anos.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Modo de uso: Recomenda-se o uso individual desse produto como medida de higiene.

Com a cabeça inclinada, gotear de 2 a 4 gotas de Soroliv Adulto® em cada narina.



Aspecto físico: Solução límpida incolor.

Características Organolépticas: Solução límpida incolor, inodora e com sabor característico.

Posologia: Gotear 2 a 4 gotas em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia. **Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS: PODE OCORRER IRRITAÇÃO LOCAL PASSAGEIRA (QUEIMAÇÃO, ARDÊNCIA E ESPÍRROS). JÁ FORAM DESCRITAS OCORRÊNCIAS DE NÁUSEA E CEFALÉIA. PACIENTES DIABÉTICOS PODEM TER O VALOR DA GLICEMIA ELEVADO COM USO CRÔNICO DA NAFAZOLINA. PACIENTES EM USO CRÔNICO DESTES PRODUTOS PODEM APRESENTAR CONGESTÃO NASAL POR EFEITO REBOTE E SEU USO PROLONGADO PODE ACARREJAR RINITE



MEDICAMENTOSA.

Conduta em caso de superdose: Nos casos de superdosagem podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaleia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

Cuidados de conservação e uso: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

TODOS OS MEDICAMENTOS DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas: O cloridrato de nafazolina é um agonista alfa-adrenérgico utilizado como vasoconstritor e descongestionante nasal, com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas). A administração intranasal da nafazolina leva a um processo de constrição dos vasos dilatados da mucosa nasal, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema tissular.

Indicações: Soroliv Adulto® está indicado como descongestionante de uso tópico nasal.

CONTRAINDICAÇÕES: SOROLIV ADULTO® ESTÁ CONTRAINDICADO NO CASO DE HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM CRIANÇAS PRINCIPALMENTE MENORES DE 12 ANOS E DURANTE A GRAVIDEZ. ESTE MEDICAMENTO DESTINA-SE AO USO TÓPICO NASAL, SENDO CONTRAINDICADO SEU USO EM INALOTERAPIA.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto: Recomenda-se o uso individual desse produto como medida de higiene.

DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Posologia: Gotear 2 a 4 gotas de Soroliv Adulto® em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia.

ADVERTÊNCIAS: A FIM DE DIMINUIR O RISCO DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO, O FRASCO GOTEJADOR NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA. ESTE MEDICAMENTO DEVE SER UTILIZADO COM CAUTELA EM PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES E HIPERTIREOIDISMO, *DIABETES MELLITUS*, HIPERTROFIA PROSTÁTICA E PACIENTES QUE APRESENTEM FORTE REAÇÃO A

