

**ACNE - ROSÁCEA
SEBORRÉIA**

Uso Tópico:

EMULSÃO, GEL SAPONI- FICANTE OU LOÇÃO HIDRO- ALCOÓLICA DE ÁCIDO RETINÓICO	Ácido Retinóico 0,01 a 1,0% Emulsão O/A, Gel saponificante "Oil Free" ou Loção hidroalcoólica q.s.p.50g/ml	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica.	Uso: À noite, a critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Acetato de Hidro- cortisona 1% Eritromicina 2 a 4%
--	---	---	--

EMULSÃO, GEL OU LOÇÃO HIDRO- ALCOÓLICA DE ÁCIDO RETINÓICO AP	Ácido Retinóico AP 0,001 a 0,1% Emulsão O/A, Gel base secativa "Oil Free" ou Loção hidroalcoólica q.s.p.50g/ml	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica.	Uso: À noite, a critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Acetato de Hidro- cortisona 1% Eritromicina 2 a 4%
---	--	---	--

Além de sua ação esfoliativa, o **Ácido Retinóico** apresenta uma interferência sobre a formação dos comedões, estimulando a atividade mitótica e aumentando o *turn over* das células epiteliais foliculares, extrusando-os consequentemente.

O **Ácido Retinóico**, quando *encapsulado no interior de uma partícula de lipossomas*, produz baixa irritação local e reduz a chance de desativação devido à oxidação. Isto se deve ao nível maior de concentrações da substância na derme. A penetração percutânea do **Ácido Retinóico AP** é duas vezes menor que o convencional.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
ÁCIDO RETINÓICO CONVENCIONAL	ÁCIDO RETINÓICO AP
0,001%	0,0001%
0,01%	0,001%
0,025%	0,0025%
0,05%	0,005%
0,075%	0,0075%
0,1%	0,01%

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

LOÇÃO OU GEL DE ISOTRETINOÍNA	Isotretinoína 0,01 a 0,1% Loção hidroalcoólica ou gel base q.s.p.50ml/g	Indicação: Acne Cística e/ou Conglobata. Ação: Anti-seborréica e antiinflamatória dérmica.	Uso: À noite. Obs: Usar protetor solar.
--	---	--	---

A **Isotretinoína** apresenta eficácia semelhante ao Ácido Retinóico, exercendo um potencial menos irritativo que este.

LOÇÃO OU GEL DE ÁCIDO GLICÓLICO	Ácido Glicólico 2 a 12% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Hidrocortisona .1%
--	--	---	--

O **Ácido Glicólico** promove o enfraquecimento das ligações extra-celulares da camada germinativa do estrato córneo, diminuindo a coesão córnea.

LOÇÃO OU GEL GLICÓLICO ANTIACNE	Ácido Glicólico 2 a 12% Eritromicina 4% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica e antibacteriana.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico. Opcional: Dexametazona 0,1 a 0,5% ou Valerato de Beta- metazona 0,05 a 0,1%
--	---	---	---

LOÇÃO OU GEL DE ÁCIDO LÁTICO	Ácido Lático 2 a 12% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico. Opcional: Hidrocortisona.1%
---	---	---	--

O **Ácido Lático** promove o enfraquecimento das ligações extra-celulares da camada germinativa do estrato córneo, diminuindo a coesão córnea. Quando apli-

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

cado topicalmente, baixa o pH da pele, diminuindo a proliferação bacteriana, em especial o *Propionibacterium acnes*.

LOÇÃO OU GEL LACTADO ANTIACNE	Ácido Lático 2 a 12% Eritromicina 2% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica e antibacteriana.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico. Opcional: Dexametazona 0,1 a 0,5% ou Valerato de Beta- metazona 0,05 a 0,1%
--	--	---	--

LOÇÃO OU GEL LACTADO ANTIACNE-F	Ácido Lático 2 a 12% Eritromicina 4% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: No Acne e nas Hiperqueratoses. Ação: Ceratolítica e antibacteriana.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico. Opcional: Dexametazona 0,1 a 0,5% ou Valerato de Beta- metazona 0,05 a 0,1%
--	--	---	--

GEL OU LOÇÃO DE FLUTAMIDA	Flutamida 2 - 3% Loção hidroalcoólica ou gel base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	---

A **Flutamida** é um puro antiandrogênico não-esteróide que demonstra potente ação antiandrogênica mediante captação e/ou inibição da ligação celular do androgênio nos tecidos-alvo em nível celular. Não possui atividade hormonal ou anti-hormonal intrínseca.

A **Flutamida** atua diretamente sobre a atividade androgénica, que pode ser expressada tanto por superprodução de esteróides ou por sua alta utilização no nível dos dutos das glândulas sebáceas, como uma consequência dos baixos níveis de SHBG (Sex-Hormone-Binding-Globulin) ou altos de 5-alfa-redutase.

Diferentemente da Espironolactona e do Acetato de Ciproterona, a **Flutamida** não tem atividade glicocorticóide, progestacional, androgênica ou estrogênica.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

GEL OU LOÇÃO ANTIINFLA- MATÓRIA COM FLUTAMIDA	Flutamida 2 - 3% Valerato de Betame- tazona 0,05% Loção hidroalcoólica ou base secativa "Oil Free" q.s.p.50ml/g	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Antiinflamatória, antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
GEL ANTIACNE COM FLUTAMIDA	Flutamida 2% Peróxido de Benzoíla 10% Eritromicina 4% Sulfato de Zn 2% Gel base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Antiinflamatória, antibacteriana, secativa, ceratolítica, antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO, GEL OU EMULSÃO DE ÁCIDO AZELÁICO	Ácido Azeláico 15-20% Loção hidroalcoólica, gel base secativa "Oil Free" ou emulsão O/A q.s.p.50ml/g	Indicação: Acne e Hiperpigmentação. Ação: Bactericida e inibidora da tirosinase.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.

O **Ácido Azeláico** inibe o crescimento de bactérias do gênero *Propionibacterium* (*Corynebacterium acnes*) e impede a formação de ácidos graxos que estimulam esta afecção. Atua, também, como inibidor competitivo da tirosinase.

Não produz efeitos tóxicos nem teratogenicidade e pode ser usado durante a lactação. Podem ocorrer pruridos e descamações locais transitórias nas primeiras semanas do tratamento.

EMULSÃO AZELÁICA	Ácido Azeláico .. 10% Eritromicina 2% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Acne e Hiperpigmentação. Ação: Bactericida e inibidora da tirosinase.	Uso: A critério médico.
-----------------------------	---	--	--------------------------------------

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

EMULSÃO AZELÁICA-F	Ácido Azeláico .. 15% Eritromicina 4% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Acne e Hiperpigmentação. Ação: Bactericida e inibi- dora da tirosinase.	Uso: A critério médico.
---------------------------	---	---	--------------------------------------

EMULSÃO AZELÁICA COMPOSTA	Ácido Azeláico .. 10% Eritromicina 2% D-Pantenol 2% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Acne e Hiperpigmentação. Ação: Bactericida, cicatrizante, anti- seborréica e inibidora da tirosinase.	Uso: A critério médico.
----------------------------------	--	---	--------------------------------------

EMULSÃO AZELÁICA COMPOSTA-F	Ácido Azeláico .. 15% Eritromicina 4% D-Pantenol 4% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Acne e Hiperpigmentação. Ação: Bactericida, cicatrizante, anti- seborréica e inibidora da tirosinase.	Uso: A critério médico.
------------------------------------	--	---	--------------------------------------

GEL ANTIACNE A 2,5%	Peróxido de Benzóila 2,5% Ácido Glicirrhízico 1,0% Ácido Salicílico 0,3% Azuleno 0,02% Mentol 0,2g Frescolat 0,3g Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana, antiinflamatória, anti-seborréica, adstringente e ceratolítica.	Uso: A critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Eritromicina 2% ou Clindamicina 1%
----------------------------	---	---	---

O **Ácido Glicirrhízico** é um antiinflamatório não-esteróide extraído do alcaçuz (Glicirriza Glaba). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatória e antialérgica.

O **Azuleno**, substância obtida por síntese, quimicamente correspondente ao ciclopentaciclohepteno, é um antiinflamatório não-esteróide oriundo da Camomila Romana. Exerce atividade antialérgica, de regeneração tissular além de antiinflamatória.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

O **Ácido Salicílico** é um agente ceratolítico, antisséptico, bacteriostático e fungicida. Age liberando a ceratina e eliminando o epitélio cornificado, descamando a epiderme e tornando-a mais receptível à ação dos outros princípios ativos.

SUPER ACNEGEL COMPOSTO	Peróxido de Benzoíla 10,0% Enxofre 5% Ácido Salicílico . 0,5% Clioquinol 3% Clindamicina 2,0% Dexametazona .. 0,5% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne conglobata. Ação: Antiinflamatória, antimicrobiana, antisséptica, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico.
LOÇÃO BENZAMAX	Peróxido de Benzoíla 20% Loção hidroalcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Acne severa. Ação: Antisseborréica, secativa e ceratolítica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO BENZAMAX-F	Peróxido de Benzoíla 20% Eritromicina 4% Loção hidroalcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Acne severa. Ação: Antisseborréica, antimicrobiana, secativa e ceratolítica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
EMULSÃO ANTIACNÉICA COMPOSTA	Peróxido de Benzoíla 5% Miconazol 2% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana, antifúngica e ceratolítica.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.

Além de ser um antimicótico de amplo espectro, o **Miconazol** atua sobre bactérias tipo estreptococos e estafilococos.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

CLINDAMICINA COMPOSTA	Peróxido de Benzoíla 5,0% Clindamicina 1,0% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne. Ação: Antimicrobiana, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Dexametazona 0,1% ou Hidrocortisona.1%
CLINDAMICINA COMPOSTA-F	Peróxido de Benzoíla 10,0% Clindamicina 2,0% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne. Ação: Antimicrobiana, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Dexametazona 0,1% ou Hidrocortisona.1%
ERITROMICINA COMPOSTA	Peróxido de Benzoíla 5,0% Eritromicina 2,0% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne. Ação: Antimicrobiana, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Dexametazona 0,1% ou Hidrocortisona.1%
ERITROMICINA COMPOSTA-F	Peróxido de Benzoíla 10,0% Eritromicina 4,0% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne. Ação: Antimicrobiana, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico. Obs: <i>Opcional:</i> Dexametazona 0,1% ou Hidrocortisona.1%
GEL OU EMULSÃO DE METRO- NIDAZOL	Metronidazol .. 1 - 5% Gel base secativa "Oil Free" ou emulsão O/A q.s.p.50g/ml	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana.	Uso: A critério médico.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

ACNEGEL	Óxido de Zinco . 40% Sulfato de Zinco 10% Eritromicina 2% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne. Ação: Secativa, antisséptica, adstringente e bactericida.	Uso: À noite.
----------------	---	---	-------------------------

SUPER ACNEGEL	Óxido de Zinco . 50% Sulfato de Zinco 15% Eritromicina 4% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne severa. Ação: Secativa, antisséptica, adstringente e bactericida.	Uso: À noite.
----------------------	---	--	-------------------------

LOÇÃO ANTIIN-FLAMATÓRIA PARA O ACNE	Valerato de Betametazona 0,05% Sulfato de Gentamicina 0,1% Clioquinol 2,0% Neomicina 0,5% Loção hidroalcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Acne pustulosa. Ação: Antiinflamatória, bacteriostática e antimicrobiana.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
--	---	---	--

O **Valerato de Betametazona** é um corticosteróide dotado de grande capacidade antiinflamatória e antipruriginosa. Sua atividade biológica tem meia-vida de mais de 48 horas.

A **Neomicina** é um antibiótico de amplo espectro, inibidora de microrganismos Gram-negativos (Pr. Vulgaris, Enterobacter aerogenes) e Gram-positivos (Staph. aureus).

LOÇÃO SALICILADA ANTIIN-FLAMATÓRIA	Acetonido de Triancinolona ... 0,2% Ácido Salicílico 2,0% Cloreto de Benzalcônio 0,5% Loção hidroalcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Acne pustulosa. Ação: Antiinflamatória, ceratolítica e antibacteriana.	Uso: A critério médico.
---	---	--	--------------------------------------

O **Cloreto de Benzalcônio** é um amônio quaternário com propriedades desinfetantes e antissépticas.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

LOÇÃO ESFOLIANTE ANTIACNE	Acido Salicílico ... 2% Resorcina 2% Enxofre Líquido 1% Óxido de Zinco ... 2% Álcool a 70° 3% Água de Rosas q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Dermatite Seborréica. Ação: Ceratolítica, antisséptica, bacteriostática, anti-seborréica e secativa.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO BORICADA ANTIACNE	Ácido Salicílico 0,2% Ácido Bórico 1,0% Água de Rosas q.s.p.100ml	Indicação: Acne. Ação: Ceratolítica, antisséptica, bacteriostática e adstringente.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO ROSADA 5%	Resorcina 5g Enxofre ppt 10g Ácido Lático 1g Glicerina 1g Bentonita 5g Fenol 11 gotas Álcool Canforado 30ml Óxido de Ferro Neutro Marrom ... q.s. Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Dermatite Seborréica. Ação: Ceratolítica, antisséptica, adstringente e secativa.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO ROSADA 10%	Resorcina 10g Enxofre ppt 10g Ácido Lático 1g Glicerina 1g Bentonita 5g Fenol 11 gotas Álcool Canforado 30ml Óxido de Ferro Neutro Marrom ... q.s. Óxido de Zinco ... q.s. Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Dermatite Seborréica. Ação: Ceratolítica, antisséptica, adstringente e secativa.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

LOÇÃO ROSADA ESPECIAL	Eritromicina 2% Desonida 0,05% Loção Rosada 5% q.s.p.50ml	Indicação: Acne severa. Ação: Antiinflamatória, antibacteriana, ceratolítica, antisséptica, adstringente e secativa.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
--------------------------------------	--	--	--

A **Desonida** é um corticóide não-fluorado cerca de 60 vezes mais potente que a Hidrocortisona e apresenta excelentes resultados terapêuticos comparáveis aos dos corticosteróides fluorados. É contra-indicada em tuberculose cutânea, lesões viróticas ou em caso de insuficiência circulatória.

LOÇÃO ROSADA ESPECIAL-F	Eritromicina 4% Desonida 0,1% Loção Rosada 10% q.s.p.50ml	Indicação: Acne severa. Ação: Antiinflamatória, antibacteriana, ceratolítica, antisséptica, adstringente e secativa.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	--

LOÇÃO DE KUMMERFELD	Enxofre ppt 1g Álcool Canforado . 1g Alcoolato de Lavanda 2g Propilenoglicol 2ml Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Seborréia fluente. Ação: Antisséptica e adstringente.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------------------	--	---	--

LOÇÃO ALBA 5 - 10 - 15%	Sulfato de Zinco 5 - 10 - 15% Sulfureto de Potássio 5 - 10 - 15% Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Seborréia fluente. Ação: Cicatrizante, ceratolítica, secativa e adstringente.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------------------	--	--	--

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

LOÇÃO ALBA MODIFICADA	Sulfato de Zinco 10% Sulfureto de Potássio 10% Calamina 10% Bentonita 20% Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Cicatrizante, secativa, ceratolítica e adstringente.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO DE VLEMINCKX	Óxido de Cálcio . 16g Enxofre Sublimado 25g Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Acne. Ação: Antisséptica e adstringente	Uso: A critério médico.
LOÇÃO DE REES	Enxofre 3g Sulfato de Zinco .. 3g Óxido de Zinco 5g Borato de Sódio .. 5g Acetona, Água Canforada e Água de Rosas ään Conteúdo 100ml	Indicação: Acne. Ação: Antisséptica, adstringente, cicatrizante e secativa.	Uso: A critério médico.
LOÇÃO ANTI-SEBORRÉICA	Resorcina 5,0g Mentol 0,5g Irgasan DP300 . 0,3g Enxofre 0,5g Calamina Líquida 5,0g Propilenoglicol 0,3ml Álcool Etílico 45ml Água q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Antisséptica, adstringente, cicatrizante, secativa e ceratolítica.	Uso: A critério médico.

Vide seções de **ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.**

LOÇÃO VEGETAL ANTI-ACNE	Extratos Vegetais: Tuya 5% Guaçatonga 5% Confrey 4% Aloe Vera 4% Calêndula 2% Tomilho 2% Hamamélis 2% Arnica 2% Mirra 2% Alantoína 1% Mentol 0,2g Frescolat 0,5g Água de Rosas q.s.p.100ml	Indicação: Acne vulgar, Seborréia. Ação: Antiinflamatória, cicatrizante, antisséptica, antimicrobiana, reepitelizante e adstringente.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	--

O **Extrato Vegetal de Tuya** (*Thuya Occidentalis*) possui ação cicatrizante.

A **Guaçatonga**, *Casearia Silvestris*, é uma planta da família das Flacurtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano, antipruriginoso e fungicida.

O **Tomilho**, *Thymus Vulgaris*, possui ações desinfetante e adstringente.

A **Mirra** é adstringente.

O **Frescolat**, *Menthyl Lactate*, é um cristal incolor não-irritante que proporciona suave efeito refrescante.

LOÇÃO PARA HIGIENE CUTÂNEA	Extrato Vegetal de Guaçatonga 5,0% Extrato Vegetal de Calêndula 5,0% Tintura de Própolis 5,0% Ácido Salicílico 0,5% Irgasan 0,3% Propilenoglicol . 2,0% Tween 80 5,0% Álcool Canforado 60,0% Água Destilada q.s.p..100ml	Indicação: Acne e Seborréia. Ação: Antiinflamatória, descongestionante, antisséptica, cicatrizante e antimicrobiana.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	--	---	--

A **Guaçatonga**, *Casearia Silvestris*, é uma planta da família das Flacurtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano, antipruriginoso e fungicida.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

LOÇÃO COM ETIL LACTATO	Etil Lactato 10ml Ácido Lático 0,2ml Álcool 44ml Água q.s.p.100ml	Indicação: Acne, Hiperqueratose Folicular. Ação: Ceratolítica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO DE SULFA- CETAMIDA	Sulfacetamida Sódica 8 a 10% Álcool Etílico a 96º 60ml Veículo .. q.s.p.100ml	Indicação: Acne e Seborréia. Ação: Antibacteriana e anti-seborréica.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO ANTI 5 ALFA REDUTASE	Piridoxina 0,5% Sulfato de Zn ... 0,5% Loção hidroalcoólica q.s.p.100ml	Indicação: Acne e Seborréia. Ação: Antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
SABONETE LÁTICO	Ácido Lático 4% Lactoserum q.s. Óleo Vegetal Hidrogenado q.s. Shampoo base espe- cial q.s.p.100ml	Indicação: Nas Dermatites Se- borréicas escamosas. Ação: Normalizadora do pH cutâneo, emoliente e antisséptica.	Uso: Massagear suavemente na pele e enxaguar.

O **Ácido Lático** promove o enfraquecimento das ligações extra-celulares da camada germinativa do estrato córneo, diminuindo a coesão córnea. Quando aplicado topicalmente, baixa o pH da pele, diminuindo a proliferação bacteriana.

O **Lactoserum** é um composto de 17 aminoácidos extraídos cuidadosamente a partir do fracionamento da proteína do soro do leite animal. É altamente dermoprotetor e regenerador.

BENZACLEAN	Peróxido de Benzoíla 5% Sabonete base gelificada "Oil Free". q.s.p.50g	Indicação: Como coadjuvante no tratamento da pele acnéica e lipídica. Ação: Ceratolítica, antissép- tica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
-------------------	--	---	--------------------------------------

O **Benzaclean** é um sabonete em base gelificada isenta de óleo que foi especialmente desenvolvido para limpar a pele lipídica e/ou acneica. **Benzaclean** contém

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

em sua fórmula o *Peróxido de Benzoíla*, princípio ativo de ação antibacteriana, queratolítica e anti-seborréica.

BENZA-CLEAN-F	Peróxido de Benzoíla 10% Irgasan DP 300 .. 2% Sabonete base gelificada "Oil Free" q.s.p.50g	Indicação: Como coadjuvante no tratamento da pele acnéica e lipídica. Ação: Ceratolítica, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
----------------------	---	--	-----------------------------------

O **Benzaclean-F** é um sabonete em base gelificada isenta de óleo que foi especialmente desenvolvido para limpar a pele lipídica e/ou acnéica. **Benzaclean-F** contém em sua fórmula o *Peróxido de Benzoíla*, princípio ativo de ação bactericida, queratolítica e anti-seborréica e o *Irgasan DP 300*, substância de ação antisséptica e bacteriostática de amplo espectro.

SABONETE LÍQUIDO ANTI-ACNE	Ácido Salicílico ... 2% Irgasan DP 1% Cloreto de Benzalcônio 1% Enxofre 2% Sabonete Líquido base q.s.p.50ml	Indicação: Como coadjuvante no tratamento da pele acnéica e lipídica. Ação: Ceratolítica, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
-----------------------------------	---	--	-----------------------------------

SABONETE VEGETAL ANTI-ACNE	Extratos Vegetais: Arnica 10% A. Millefolium 10% Confrey 5% Calêndula 5% Tuya 5% Própolis 5% Sabonete Líquido base q.s.p.50ml	Indicação: Como coadjuvante no tratamento da pele acnéica. Ação: Antiinflamatória, cicatrizante, adstringente e antieritematosa.	Uso: A critério médico.
-----------------------------------	---	---	-----------------------------------

O *Extrato Vegetal de Tuya* (*Thuya Occidentalis*) possui ação cicatrizante.

O *Extrato Vegetal de Arnica* age ativando a circulação sanguínea. Tem propriedades antiinflamatória e adstringente.

O *Extrato Vegetal de Achillea Millefolium* é rico em luteolina. É tônico, clareante e adstringente.

O *Extrato Vegetal de Confrey* é altamente cicatrizante.

O *Extrato Vegetal de Calêndula* limpa profundamente a pele e reduz o eritema.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING.

SABONETE LÍQUIDO SALICILADO	Ácido Salicílico . 10% Enxofre ppt 5% Sabonete Líquido base q.s.p.100ml	Indicação: Como ceratolítico e bactericida. Ação: Ceratolítica, antisséptica e bactericida.	Uso: A critério médico.
------------------------------------	---	--	-----------------------------------

O **Ácido Salicílico** é um agente ceratolítico, antisséptico, bacteriostático e fungicida. Age liberando a ceratina, eliminando o epitélio cornificado e descamando a epiderme.

SABONETE LÍQUIDO CERATOLÍTICO	Ácido Salicílico . 10% Resorcina 10% Sabonete Líquido base q.s.p.100ml	Indicação: Como ceratolítico. Ação: Ceratolítica, antisséptica e bacteriostática.	Uso: A critério médico.
--------------------------------------	--	--	-----------------------------------

SABONETE LÍQUIDO ESFOLIANTE	Ácido Salicílico . 10% Peróxido de Benzoíla 10% Sabonete Líquido base q.s.p.100ml	Indicação: Como ceratolítico e antibacteriano. Ação: Ceratolítica e antibacteriana.	Uso: A critério médico.
------------------------------------	---	--	-----------------------------------

SABONETE ANTI 5 ALFA REDUTASE	Piridoxina 0,5% Sulfato de Zn ... 0,5% Metionina 2,0% Sabonete Líquido base q.s.p.100ml	Indicação: Acne e Seborréia. Ação: Antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
--------------------------------------	--	---	-----------------------------------

ABRASIVO ANTI-SEBORRÉICO (Baixo teor lipídico)	Irgasan DP 1,0% Cloreto de Benzalcônio 0,5% Ácido Salicílico 1,0% Lauril Éter Sulfato de Sódio 15,0% Grãos do Polietileno 40,0% Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza e desincrustação da pele seborréica, sequelas de acne. Ação: Abrasiva, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: Massagear suavemente na área afetada previamente umedecida, até 2 vezes ao dia - a critério médico.
---	---	---	--

Vide seções de **ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING**.

ABRASIVO CALCÁREO (Baixo teor lipídico)	Algumas Calcáreas 20% Quartzo de Malha 10% Alantoína 1% Lauril Éter Sulfato de Sódio 25% Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza da pele, como desincrustante. Ação: Abrasiva e reepitelizante.	Uso: Massagear suavemente na área afetada previamente umedecida, até 2 vezes ao dia - a critério médico.
--	---	---	--

ABRASIVO ENZIMÁTICO (Baixo teor lipídico)	Papaína 1,5% Pancreatina 1,5% Alantoína 2% Grãos do Polietileno 40% Base especial de baixo teor lipídico q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza da pele, como desincrustante. Ação: Abrasiva, debridante, proteolítica e reepitelizante.	Uso: A critério médico.
--	--	--	--------------------------------------

As enzimas do **Abrasivo Enzimático** promovem a retirada do tecido desvitalizado e de matérias estranhas contidas no epitélio, originando um verdadeiro debridamento tecidual. O paciente deve ser instruído a deixar o produto agir na pele por alguns minutos e massagear suavemente, logo em seguida. Retirar bem o produto com água em abundância. Pacientes com a pele ferida e/ou inflamada não devem massageá-la.

SABÃO CREME ABRASIVO	Quartzo de Malha.... 40% Base cremosa espec- cial q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza da pele, como desincrustante. Ação: Abrasiva.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
-------------------------------------	--	---	--

PÓ ANTI- SEBORRÉICO	Ácido Salicílico ... 2% Óxido de Zinco ... 5% Enxofre 2% Lauril Éter Sulfato de Sódio 10% Bentonita ... q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza da pele acnéica e seborréica. Ação: Ceratolítica, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: Umedecer o pó com água e massagear na face, 2 vezes/dia.
------------------------------------	--	---	--

PÓ ANTI- ACNÉICO	Ácido Salicílico ... 1% Irgasan DP 1% Alantoína 1% Lauril Éter Sulfato de Sódio 50% Bentonita ... q.s.p.50g	Indicação: Na limpeza da pele acnéica e seborréica. Ação: Ceratolítica, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: Umedecer o pó com água e massagear na face, 2 vezes/dia.
---------------------------------	--	---	--

Vide seções de **ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING**.

GEL ANTIACNE A 5%	Peróxido de Benzoíla 5% Ácido Glicirrhízico 1,5% Ácido Salicílico 0,6% Azuleno 0,04% Mentol 0,2g Frescolat 0,3g Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana, antiinflamatória, anti-seborréica, adstringente e ceratolítica.	Uso: A critério médico. Obs: Opcional: Eritromicina 2% ou Clindamicina 2%
--------------------------	---	---	---

O **Ácido Glicirrhízico** é um antiinflamatório não esteróide extraído do alcaçuz (Glicirriza Glaba). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatórias e antialérgicas.

O **Azuleno**, substância obtida por síntese, quimicamente correspondente ao ciclopentaciclohepteno, é um antiinflamatório não esteróide oriundo da Camomila Romana. Exerce atividade antialérgica, de regeneração tissular além de antiinflamatória.

GEL ANTIACNE A 10%	Peróxido de Benzoíla 10% Ácido Glicirrhízico 2,0% Ácido Salicílico 1,0% Azuleno 0,05% Mentol 0,2g Frescolat 0,4g Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.50g	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana, antiinflamatória, anti-seborréica, adstringente e ceratolítica.	Uso: A critério médico. Obs: Opcional: Eritromicina 4% ou Clindamicina 3%
---------------------------	--	---	---

ACNEGEL COMPOSTO	Peróxido de Benzoíla 5% Enxofre 2,5% Ácido Salicílico . 0,2% Clioquinol 1,5% Clindamicina 1,0% Dexametazona 0,25% Base secativa "Oil Free" ... q.s.p.30g	Indicação: Acne. Ação: Antiinflamatória, antimicrobiana, antisséptica, ceratolítica e secativa.	Uso: A critério médico.
-------------------------	---	--	-----------------------------------

O **Clioquinol** é uma substância antimicrobiana ativa contra um amplo espectro de microrganismos patogênicos, como fungos (Candida, Microsporum, Tricofiton) e bactérias Gram-positivas (estafilococos).

Vide seções de ANTIBIÓTICOS, CERATOLÍTICOS e PEELING..

SALI-PÓ	Ácido Salicílico . 10% Enxofre 5% Ácido Bórico 5% Lauril Éter Sulfato de Sódio 80% Conteúdo 100g	Indicação: Na limpeza da pele acnéica e seborréica. Ação: Ceratolítica, adstringente, antisséptica e anti-seborréica.	Uso: Umedecer o pó com água e massagear na face, 2 vezes/dia.
----------------	---	--	--

Uso Interno:

CÁPSULAS DE ISOTRE- TINOÍNA	Isotretinoína ... 20mg	Indicação: Acne Conglobata e Cística. Ação: Anti-seborréica e antiinflamatória dérmica.	Posologia: A critério médico.
--	------------------------	---	--

Na terapia da acne profunda grave, conglobata e cística, a **Isotretinoína** oral - um estereoisômero sintético do ácido all-transretinóico - é a droga de escolha para pacientes que não responderam a tratamentos com antibióticos.

A **Isotretinoína** é uma droga altamente teratogênica, e só deve ser prescrita por médicos experientes em terapia com retinóides. Seu mecanismo de ação ainda não foi elucidado em detalhes, porém já se estabeleceu que a melhora do quadro clínico do acne severo está associada com a supressão dose-dependente da atividade da glândula sebácea e com a redução destas glândulas - demonstrado histologicamente. Estabeleceu-se, inclusive, o efeito antiinflamatório dérmico da **Isotretinoína**.

A terapêutica deve ser iniciada com 0,5mg/kg diários. Após cerca de quatro semanas, a dose deverá ser reajustada na variação de 0,1 a 1,0mg/kg ao dia, conforme as necessidades individuais. A dose máxima de 1mg/kg ao dia somente deve ser administrada por um período de tempo limitado. Geralmente, o tratamento dura um total de 16 semanas. Se for necessário retomar o tratamento, deve-se aguardar um período de oito semanas antes do reingresso. As cápsulas são ingeridas durante as refeições. Os pacientes devem evitar exposição ao sol.

A **Isotretinoína** está rigorosamente contra-indicada nos casos de gravidez, lactação, insuficiências renal e hepática, hiperavitaminose A e em pacientes com valores lipídicos sanguíneos excessivamente elevados.

Os efeitos colaterais mais comuns são o ressecamento da conjuntiva e das mucosas e queilite. Podem ocorrer sintomas músculo-esqueléticos. É indispensável investigar a função hepática e renal, além dos níveis de triglicerídeos e colesterol, antes e durante o tratamento.

Vide seções de ANTIBIÓTICOS e CORTICOSTERÓIDES.

CÁPSULAS DE FLUTAMIDA	Flutamida 250mg	Indicação: Acne e Seborréia por androgenicidade. Ação: Antiandrogênica - anti 5-alfa-redutase e anti-seborréica.	Posologia: A critério médico.
------------------------------	-----------------------	---	---

A **Flutamida** é um puro antiandrogênico não-esteróide que demonstra potente ação antiandrogênica mediante captação e/ou inibição da ligação celular do androgênio nos tecidos-alvo em nível celular. Não possui atividade hormonal ou anti-hormonal intrínseca.

A **Flutamida** atua diretamente sobre a atividade androgénica, que pode ser expressa tanto por superprodução de esteróides ou por sua alta utilização no nível dos dutos das glândulas sebáceas, como uma consequência dos baixos níveis de SHBG (Sex-Hormone-Binding-Globulin) ou altos de 5-alfa-redutase.

Pode ser indicada como monoterapia ou em combinação com um anovulatório, em especial para mulheres em idade fértil.

Devem ser realizados testes periódicos de função hepática, pois foram relatadas alterações nas transaminases, Icterícia Colesática, Necrose Hepática e Encefalopatia.

As reações adversas mais frequentes observadas com o uso da **Flutamida** são Ginecomastia e/ou sensibilidade mamária aumentada, às vezes acompanhadas de Galactorréia. Estas reações desaparecem com a interrupção do tratamento ou a redução da dosagem.

Diferentemente da Espironolactona e do Acetato de Ciproterona, a **Flutamida** não tem atividade glicocorticóide, progestacional, androgênica ou estrogênica.

A dosagem recomendada é de 250 a 700mg VO, diariamente.

FLACONETES ANTI-ACNE	Vitamina A . 50.000UI Vitamina E 300UI Ácido Fólico 5mg Zinco Quelato . 10mg Água Destilada e Sorbitol 1:1 Conteúdo 10ml	Indicação: Como suplemento alimentar coadjuvante no tratamento do Acne. Ação: Normalizadora das funções ectodérmicas.	Posologia: 2 flaconetes ao dia, após as refeições.
-----------------------------	---	--	--

SULFATO DE ZINCO CÁPSULAS	Sulfato de Zinco 220mg	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Cicatrizante e anti-seborréica.	Posologia: 1 cápsula 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	------------------------------	--	---

Cada cápsula contém 50mg de íon/Zn.

Ver seções de ANTIBIÓTICOS e CORTICOSTERÓIDES.

O **Sulfato de Zinco** é usado com sucesso no controle da manifestação de Acrodermatite enteropática. Também tem mostrado uma melhora na cicatrização geral, assim como em úlceras de perna.

SULFATO DE ZINCO XAROPE	Sulfato de Zinco 220mg\10ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.120ml	Indicação: Acne, Seborréia. Ação: Cicatrizante e anti-seborréico.	Posologia: Até 660mg ao dia, a critério médico.
--	---	---	--

Cada 10 ml do xarope contém 50mg de íon/Zn.

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;
Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;
Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e
Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

ACNE CAPS	Cloridrato de Tetraciclina 250 - 500mg	Indicação: Acne, Rosácea. Ação: Antibacteriana e anti-seborréica.	Posologia: A critério médico.
----------------------	--	---	--

ACNE CAPS COM NISTATINA	Cloridrato de Tetraciclina 250 - 500mg Nistatina .. 100.000UI	Indicação: Acne, Rosácea. Ação: Antibacteriana, anti-se- borréica e antifúngica.	Posologia: A critério médico.
--	--	--	--

ACNE PILLS	Cloridrato de Minoxiclina 50 - 100mg	Indicação: Acne. Ação: Antibacteriana.	Posologia: A critério médico.
-----------------------	--	---	--

ACNE-D	Diamino Difenil Sulfona (DDS) 50 - 100mg	Indicação: Acne Conglobata. Ação: Antibacteriana.	Posologia: A critério médico.
---------------	--	--	--

Vide seções de ANTIBIÓTICOS e CORTICOSTERÓIDES.