

**ANTISSÉPTICOS
E
CICATRIZANTES**

Uso Tópico:

GEL CICATRIZANTE	Extrato Vegetal de Calêndula 5% Azuleno 0,05% Alfa Bisabolol 1% D-Pantenol 2,5% Gel base q.s.p.50g	Indicação: Queimaduras, úlceras e ferimentos. Ação: Cicatrizante, calmante, bactericida e antiinflamatória.	Uso: Duas vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	---	--	--

O **Extrato Vegetal de Calêndula** apresenta propriedades dermo-purificante, antiinflamatória, emoliente, antisséptica e cicatrizante.

O **Alfa-Bisabolol** é um álcool monocíclico insaturado, componente do óleo essencial de Camomila. Apresenta propriedades antiinflamatória, bactericida e cicatrizante. É indicado em casos de pequenas lesões cutâneas, inflamações leves e queimaduras.

O **Azuleno**, substância obtida por síntese, quimicamente correspondente ao ciclopentaciclohepteno, é um antiinflamatório não-esteróide oriundo da Camomila Romana. Exerce atividade antialérgica, de regeneração tissular além de antiinflamatória.

GEL CICATRIZANTE COM IRGASAN	Clorhexidine 1% Irgasan 0,3g Alantoína 1,0g Azuleno 0,05g Hidroviton 2,0g Gel base q.s.p.50g	Indicação: Queimaduras, úlceras e ferimentos. Ação: Cicatrizante, calmante, bactericida, antiinflamatória e antisséptica.	Uso: Duas vezes ao dia, a critério médico.
---	--	--	--

GEL CICATRIZANTE VEGETAL	Extrato de Arnica 2,0% Extrato de Babosa 2,0% Extrato de Calêndula 2,0% Extrato de Guaçatonga..... 5,0% Extrato de Confrey 2,0% Alantoína 1,0% D-Pantenol 1,0% Gel base q.s.p.50g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento cicatrizante. Ação: Cicatrizante, calmante, antisséptica, antiinflamatória, dermo-purificante, dermo-protetora e reepitelizante.	Uso: Duas vezes ao dia, a critério médico.
---	---	---	--

A **Guaçatonga**, Casearia Silvestris, é uma planta da família das Flacourtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano, antipruriginoso e fungicida. Tem sido usada em associação a produtos para o tratamento de aftas, herpes e picadas de insetos.

SOLUÇÃO CICATRIZANTE	Extrato Vegetal de Benjoim 10% Solução coloidal q.s.p.100ml D-Pantenol 2,5% Gel base q.s.p.50g	Indicação: Na cicatrização de feridas cirúrgicas assépticas. Ação: Antisséptica, adstringente e protetora.	Uso: Duas vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	---	---	--

CREME ANTISSÉPTICO	Hexaclorofeno 1g Creme base evanescente q.s.p.50g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento antisséptico. Ação: Antisséptica.	Uso: A critério médico.
---------------------------	---	--	-----------------------------------

CREME VEGETAL CICATRIZANTE	Extrato Vegetal de Tuya 5% Extrato de Própolis 4% Extrato Vegetal de Camomila 2% Extrato Vegetal de Confrey 5% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento cicatrizante. Ação: Cicatrizante.	Uso: 3 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------------	--	--	---

O *Extrato Vegetal de Tuya* (*Thuya Occidentalis*) possui ação cicatrizante.

CREME DE CLOSTEBOL	Clostebol 500mg Sulfato de Neomicina 500mg Vitamina A 300.000UI Vitamina D 40.000UI Creme base q.s.p.50g	Indicação: Feridas e ulcerações cutâneas; fissuras dos mamilos, anais, queimaduras e dermatoses erosivas da pele. Ação: Cicatrizante e bactericida.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------	--	--	---

CREME CICATRIZANTE	Alantoína 2% Própolis 4% Camomila 2% Creme Lanette q.s.p.50g	Indicação: Pós-cirúrgica. Ação: Calmante e cicatrizante.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------	--	---	---

CREME DE ÓLEO DE ROSA MOSQUETA	Óleo de Rosa Mosqueta 25% Creme base..... q.s.p.50g	Indicação: Queimaduras. Ação: Cicatrizante e reepitelizante.	Uso: 3 vezes ao dia, a critério médico.
ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 100%	Óleo de Rosa Mosqueta 100% q.s.p.50ml	Indicação: Queimaduras. Ação: Cicatrizante e reepitelizante.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
CREME CICATRIZANTE PRÓ-MATER	Clorhexidine 0,2% Própolis 4% Alantoína 2% Lanolina 10% Creme base q.s.p.40g	Indicação: Fissura no mamilo. Ação: Calmante, cicatrizante e antisséptica.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
CREME PRÓ-MATER FORTE	Clorhexidine 0,2% Própolis 4% Alantoína 2% Lanolina 10% Bálsamo de Peru..... 0,3% Neomicina 0,5%	Indicação: Fissura no mamilo. Ação: Calmante, cicatrizante, antisséptica e bactericida.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
CREME DE SULFADIAZINA DE PRATA	Sulfadiazina de Prata 1% Creme hipoalergênico q.s.p.100g	Indicação: Feridas infectadas em queimaduras de segundo e terceiro graus. Ação: Antimicrobiana e antisséptica.	Uso: A critério médico.

CREME IRGASAN	Irgasan DP 1,0g Creme base q.s.p.50g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento antisséptico e bactericida. Ação: Antisséptica e antibacteriana.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
--------------------------	---	---	---

PASTA DE UNNA	Óxido de Zinco .. 15g Gelatina 15g Glicerina 35ml Água Destilada q.s.p.100g	Indicação: Úlcera varicosa não infectada e varizes. Ação: Cicatrizante, antisséptica e secativa.	Uso: Aquecer em banho-maria e aplicar embebida em gaze.
--------------------------	--	---	---

POMADA CICATRIZANTE VITAMINADA	Vitamina A .. 100.000UI Vitamina D3 .. 40.000UI Óxido de Zinco 15g Talco de Veneza .. 10g Glicerina 10ml Lanolina Anidra . 25g Conservantes q.s. Silicone q.s.	Indicação: Úlcera de perna, queimaduras e feridas. Ação: Cicatrizante e antisséptica.	Uso: 2 ou 3 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	--	--

POMADA CICATRIZANTE FORTE	Vitamina A .. 100.000UI Vitamina D3 .. 40.000UI Alantoína 15g Clorhexidine 5% Óxido de Zinco .. 15g Talco de Veneza 10g Glicerina 10ml Lanolina Anidra . 25g Conservantes q.s. Silicone q.s.	Indicação: Úlcera de perna, queimaduras e feridas. Ação: Cicatrizante e antisséptica.	Uso: 2 ou 3 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	--

POMADA CICATRIZANTE ESPECIAL	Hexaclorofeno .. 0,5g Cetiol 7,5ml Vaselina branca 12,5g Lanolina 5,0g Óxido de Zinco . 10,0g Talco de Veneza 15,0g q.s.p.100g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento cicatrizante e antisséptico. Ação: Cicatrizante e antisséptica.	Uso: A critério médico.
POMADA CICATRIZANTE ANESTÉSICA	Vitamina A . 100.000UI Vitamina D3.. 40.000UI Óxido de Zinco .. 15g Talco de Veneza .. 10g Benzocaína 0,5g Conservantes q.s. Silicone q.s.	Indicação: Úlcera de perna, queimaduras e feridas. Ação: Cicatrizante, antisséptica e anestésica.	Uso: 2 ou 3 vezes ao dia, a critério médico.
POMADA DE WHITFIELD	Ácido Benzóico 12,0g Ácido Salicílico . 6,0g Lanolina 5,0g Vaselina q.s.p100g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento antisséptico, antibacteriano e antifúngico. Ação: Antisséptica, antibacteriana e antifúngica.	Uso: A critério médico.
POMADA DE ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU	Ácido Bórico 10g Óxido de Zinco 6g Óleo de Fígado de Bacalhau 10ml Lanolina Anidra . 20g Vaselina branca q.s.p.50g	Indicação: Condições cutâneas em que se requerem tratamento cicatrizante e antisséptico. Ação: Cicatrizante e antisséptica.	Uso: A critério médico.

UNGÜENTO COM ÓLEO DE MELALEUCA	Óleo de Melaleuca 5% Unguento q.s.p.50g	Indicação: No tratamento das fissuras anal e mamilar. Ação: Cicatrizante e antibacteriana.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
TALCO ANTISSÉPTICO	Amido 25g Óxido de Zinco .. 25g Ácido Bórico 25g Talco q.s.p.100g	Indicação: Em aplicações locais, como antisséptico e cicatrizante. Ação: Cicatrizante e antisséptica.	Uso: A critério médico.
SOLUÇÃO COM CLORHEXIDINE	Gluconato de Clorhexidine 0,2 a 0,5% Álcool Etílico 95° 30ml Água purificada q.s.p.100ml	Indicação: Na assepsia da pele. Ação: Antisséptica e antibacteriana, com atividade anti-fúngica sobre <i>Candida albicans</i> .	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
SOLUÇÃO OU GEL DE POVIDONE- IODINE	Povidone-Iodine 1 a 10% Gel, solução alcoólica ou aquosa q.s.p.100g/ml	Indicação: Na assepsia da pele. Ação: Antisséptica e antibacteriana.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
ÁGUA BORICADA A 3%	Ácido Bórico 3% Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Como antisséptico, principalmente em áreas próximas das mucosas. Ação: Antisséptica.	Uso: A critério médico.

ÁGUA D'ALIBOUR FORTE	Sulfato de Cobre 1,0g Sulfato de Zinco 3,5g Álcool Canforado 1,0ml Tintura de Açafrão 1,0ml Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Como antisséptico e adstringente. Ação: Antisséptica e adstringente.	Uso: A critério médico.
-------------------------------------	---	--	--------------------------------------

ÁGUA D'ALIBOUR 10%	Sulfato de Cobre 0,1g Sulfato de Zinco 0,35g Álcool Canforado 0,1ml Tintura de Açafrão 0,1ml Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Como antisséptico e adstringente. Ação: Antisséptica e adstringente.	Uso: A critério médico.
-----------------------------------	--	--	--------------------------------------

Uso Interno:

CENTELLA ASIÁTICA CÁPSULAS	Centella Asiática 300 - 500mg	Indicação: Como diurético e cicatrizante nos distúrbios da pele. Ação: Diurética e cicatrizante.	Posologia: 1 a 2 cápsulas ao dia, a critério médico.
---	--	--	--

A *Centella Asiática*, Hydrocotyle Asiatica, contém asiaticoside - princípio ativo de capacidade cicatrizante.

CENTELLA ASIÁTICA GOTAS	Tintura de Centella Asiática q.s.p.50ml	Indicação: Como diurético e cicatrizante nos distúrbios da pele. Ação: Diurética e cicatrizante.	Posologia: 20 a 100 gotas ao dia, a critério médico.
--	---	--	---

FLACONETES CICATRIZANTES	Asiaticoside 20mg Frutose q.s. Água Destilada q.s.p.10ml	Indicação: Como diurético e cicatrizante nos distúrbios da pele. Ação: Diurética e cicatrizante.	Posologia: De 20 a 60mg ao dia, a critério médico.
---------------------------------	--	---	--

O **Asiaticoside**, princípio ativo extraído da Centella Asiática, possui capacidade cicatrizante.

SULFATO DE ZINCO CÁPSULAS	Sulfato de Zinco 220mg	Indicação: Como cicatrizante geral. Ação: Cicatrizante.	Posologia: 1 cápsula 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	---------------------------------------	--	--

Cada cápsula contém 50mg de íon/Zn.

O **Sulfato de Zinco** é usado com sucesso no controle da manifestação de Acrodermatite Enteropática. Também tem mostrado uma melhora na cicatrização geral, assim como em úlceras de perna.

SULFATO DE ZINCO XAROPE	Sulfato de Zinco 220mg\10ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.120ml	Indicação: Como cicatrizante geral. Ação: Cicatrizante.	Posologia: Até 660mg ao dia, a critério médico.
--------------------------------	---	--	---

Cada 10 ml do xarope contém 50mg de íon/Zn.

O **Sulfato de Zinco** é usado com sucesso no controle da manifestação de Acrodermatite Enteropática. Também tem mostrado uma melhora na cicatrização geral, assim como em úlceras de perna.

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;
Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;
Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e
Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

CÁPSULAS JONCTUM	N-Acetil Hidroxiprolina 200mg	Indicação: Como cicatrizante, no tratamento de úlceras de estase. Ação: Cicatrizante.	Posologia: 1 cápsula 3 vezes ao dia, às refeições.
-----------------------------	---	--	--

A **N-Acetyl Hidroxiprolina** regulariza o metabolismo do tecido conjuntivo, especialmente na formação do colágeno, facilitando a cicatrização.

Nas úlceras de estase, acelera a epitelização e melhora a qualidade do tecido de granulação. Pode ser empregada como coadjuvante na terapia metabólica das osteoartrites.

Não deve ser usada na gravidez ou em crianças com menos de 12 anos.

CÁPSULAS DE ÁCIDO ASCÓRBICO	Ácido Ascórbico 0,1-2,0g	Indicação: Coadjuvante na síntese do colágeno, favorecendo a cicatrização. Ação: Cicatrizante.	Posologia: A critério médico.
--	---	--	--

O **Ácido Ascórbico** desempenha importante papel no metabolismo celular, intervindo em diversas reações metabólicas, como a hidroxilação da prolina durante a formação do tecido conjuntivo.