

**BROMIDROSE
HIPERIDROSE**

Uso Tópico:

DESO- DORANTE VEGETAL ANTITRANS- PIRANTE	Guaçatonga 5% Tomilho 5% Mirra 3% Ácido Bórico 5% Frescolat 1% Álcool Desodorizado q.s. Água de Rosas q.s.p.100ml	Indicações: Bromidrose e Hiperidrose. Ação: Desinfetante, antitranspirante, adstringente e antisséptica.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	---	---

A **Guaçatonga**, *Casearia Silvestris*, é uma planta da família das Flacurtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano e antipruriginoso.

O **Tomilho**, *Thymus Vulgaris*, possui ações desinfetante e adstringente.

A **Mirra** é adstringente.

O **Frescolat**, *Menthyl Lactate*, é um cristal incolor não-irritante que proporciona suave efeito refrescante.

DESO- DORANTE ANTI- SUDORAL	Cloridroxí Alantoinato de Alumínio 0,7g Irgasan DP 0,3g Propilenoglicol . 3,0% Álcool Canforado e Água de Rosas ãã Conteúdo 100ml	Indicações: Bromidrose e Hiperidrose. Ação: Antitranspirante, adstringente, antisséptica e antibacteriana.	Uso: A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

DESO- DORANTE PARA PELES SENSÍVEIS	Cloridrato de Alumínio 0,3% Bromoclorofeno 0,1% Alantoína 0,5% Propilenoglicol . 1,0ml Álcool Desodorizado q.s.p.100ml	Indicações: Bromidrose e Hiperidrose. Ação: Antitranspirante, antisséptica, bacteriostática e reepitelizante.	Uso: A critério médico.
---	--	--	--------------------------------------

O **Bromoclorofeno** é um antisséptico com propriedades antibacterianas similares às do Hexaclorofeno. É bem tolerado pela pele e pelas mucosas, praticamente não produzindo irritações.

DESO-DORANTE ÁLCOOL-FREE	Cloridrato de Alumínio 10,0% Uréia..... 2,0% Dehyquart A 0,5% Água Destilada q.s.p.100ml	Indicações: Bromidrose e Hiperidrose. Ação: Antitranspirante e adstringente.	Uso: A critério médico.
GEL DESO-DORANTE	Cloridroxi Alantoinato de Alumínio 0,7% Irgasan DP 0,5% Cânfora 0,6g Gel base especial q.s.p.50g	Indicações: Bromidrose. Ação: Antitranspirante, adstringente e bacteriostático.	Uso: A critério médico.
DESO-DORANTE ANTI-BROMIDROSE	Ácido Salicílico ... 1% Formol 1% Ácido Bórico 2% Cloridroxi Alantoinato de Alumínio 0,5% Álcool Canforado q.s.p.100ml	Indicações: Bromidrose. Ação: Antitranspirante, adstringente, antisséptica e antibacteriana.	Uso: A critério médico.
SABONETE DESODORIZANTE	Irgasan DP 2% Alúmen de Potássio 2% Ácido Salicílico ... 1% Frescolat 1% Sabão em barra glicerinado q.s.p.90g	Indicações: Como auxiliar no tratamento da Bromidrose e Hiperidrose. Ação: Adstringente, bacteriostática, fungicida e refrescante.	Uso: A critério médico.

O **Frescolat**, Menthyl Lactate, é um cristal incolor não-irritante que proporciona suave efeito refrescante.

PÓ ANTI-SUDORAL	Irgasan DP 0,5% Alantoinato de Alumínio 0,3% Dióxido de Titâneo 5,0% Talco q.s.p.100g	Indicações: Hiperidrose. Ação: Antisséptica, bacteriostática e adstringente.	Uso: A critério médico.
----------------------------	--	---	-----------------------------------

CALOMELANO PÓ	Calomelano 0,5g Ácido Salicílico . 0,3g Alumínio 7,0g Óxido de Zinco e Talco de Veneza . 1:1 Amido q.s.p.100g	Indicações: Bromidrose. Ação: Antisséptica e bacteriostática.	Uso: A critério médico.
TALCO MENTOLADO	Ácido Salicílico ... 2% Ácido Bórico 5% Ácido Tartárico .. 10% Óxido de Zinco . 35% Talco Mentolado q.s.p.100g	Indicações: Hiperidrose plantar. Ação: Antisséptica, bactericida, bacteriostática e fungicida.	Uso: 3 a 4 vezes ao dia.
TALCO BORICADO	Irgasan DP 1% Ácido Bórico 7% Talco Mentolado q.s.p.100g	Indicações: Hiperidrose. Ação: Antisséptica, bactericida e bacteriostática.	Uso: 3 a 4 vezes ao dia.
LOÇÃO ANTITRANS- PIRANTE	Subnitrato de Bismuto 0,5% Óxido de Zinco 0,5% Alúmen de Potássio 1,0% Glicerina q.s. Álcool Desodorizado q.s. Água Destilada q.s.p.100ml	Indicações: Reguladora da sudorese. Ação: Adstringente.	Uso: A critério médico.
LOÇÃO ALÚMEN- ROSAS	Alúmen de Potássio 4% Água de Rosas q.s.p.100ml	Indicações: Hiperidrose. Ação: Adstringente.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
LOÇÃO PARA HIPERIDROSE	Ácido Salicílico 1g Formaldeído 1ml Alcoolato de Lavanda25ml Álcool a 60° q.s.p.100ml	Indicações: Hiperidrose. Ação: Antiperspirante, antisséptica e bacteriostática.	Uso: 3 a 4 vezes ao dia.