

Uso Interno:

Além da função fisiológica de substituição no mecanismo das atividades hipotálamo-supra-renais, os **corticosteróides** têm, cada vez mais, ampla indicação em medicina geral e, sobretudo, em processos dermatológicos, graças aos seus grandes efeitos antiinflamatórios e imunossupressivos.

A terapêutica por substituição está indicada na Doença de Addison e em outras insuficiências adrenocorticais secundárias tais como: doença do soro, urticária, farmacodermias, dermatite de contacto, lúpus eritematoso, dermatomiosite, hanseníase, vasculites necrosantes e granulomatosas, buloses, sarcoidose, pioderma gangrenoso, eritrodermias, aftose, eritemas polimorfo e nodoso, púrpura anafilactóide, eventualmente em acne cístico e hidroadenite supurativa.

Para controlar a afecção em tratamento, deve-se utilizar a menor dose possível de **corticosteróides** e, quando possível a redução posológica, esta deve ser gradual. A insuficiência adrenocortical secundária de origem medicamentosa pode resultar de uma retirada muito rápida dos **corticosteróides**, e pode ser minimizada por gradual redução posológica.

Os **corticosteróides** podem exacerbar infecções fúngicas sistêmicas e, portanto, não deveriam ser usados na presença destas infecções, a menos que sejam necessários para controlar reações a drogas como a Anfotericina B. O uso concomitante de Hidrocortisona com Anfotericina B pode levar ao aumento do miocárdio e à insuficiência congestiva. Doses médias e grandes de Hidrocortisona ou Cortisona podem elevar a pressão arterial, causar retenção de água e sal e aumentar a excreção de potássio. O uso concomitante de Fenobarbital, Fenitoína, Rifampicina ou Efedrina pode aumentar o metabolismo dos **corticosteróides**, reduzindo seus efeitos terapêuticos. A associação de **corticosteróides** e diuréticos depletos de potássio pode potencializar uma hipopotassemia e a glicosídeos cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação digitálica associada à hipopotassemia. O uso concomitante de **corticosteróides** e anticoagulantes cumarínicos pode potencializar ou inibir os efeitos anticoagulantes. Todos os **corticosteróides** aumentam a excreção de cálcio. Uma vez que a secreção mineralocorticóide pode estar prejudicada, devem-se administrar simultaneamente sal e/ou mineralocorticóide. A administração de vacinas com vírus vivos é contra-indicada em indivíduos recebendo doses imunossupressivas de **corticosteróides**. Se são administradas vacinas com vírus ou bactérias inativas em indivíduos recebendo doses imunossupressivas de **corticosteróides**, a resposta esperada de anticorpos séricos pode não ser obtida. Os **corticosteróides** podem mascarar alguns sinais de infecção, podendo, durante o uso, aparecerem novas infecções.

CÁPSULAS DE DEXAMETAZONA	Dexametazona 0,75-5,0mg	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: 0,75 a 15mg por dia, a critério médico.
---------------------------------	--	--	--

A **Dexametazona** é aproximadamente equivalente à Betametazona. É de 4 a 6 vezes mais potente que a Metilprednisolona e a Triancinolona; de 6 a 8 vezes mais potente que a Prednisona e Prednisolona; de 25 a 30 vezes mais que a Hidrocortisona e cerca de 35 vezes mais potente que a Cortisona.

XAROPE DE DEXAMETAZONA	Dexametazona 0,5mg\5ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.100ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: <i>Adultos:</i> 0,75 a 15mg por dia, a critério médico. <i>Crianças:</i> 0,02 a 0,3mg por kg ao dia, a critério médico.
-------------------------------	--	--	---

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;
Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;
Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e
Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

GOTAS DE DEXAMETAZONA	Dexametazona 0,01mg\gota Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.15 ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: A critério médico.
------------------------------	--	--	---

Crianças: 0,02 a 0,3mg/kg corpóreo\dia.

CÁPSULAS DE BETAMETAZONA	Betametazona 0,5-2,0mg	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: 0,25 a 8mg por dia, a critério médico.
---------------------------------	---------------------------------------	--	---

XAROPE DE BETAMETAZONA	Betametazona0,5mg\5ml Xaropes de morango framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.100ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: <i>Adultos:</i> 0,25 a 8mg por dia, a critério médico. <i>Crianças:</i> 0,017 a 0,25mg por kg ao dia, a critério médico.
-------------------------------	--	--	--

Uma colher de *café* contém **2,5ml**;
 Uma colher de *chá* contém **5,0ml** ;
 Uma colher de *sobremesa* contém **10,0ml** e
 Uma colher de *sopa* contém **15,0ml**.

GOTAS DE BETAMETAZONA	Betametazona 0,009mg\gota Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.15ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: A critério médico.
------------------------------	--	--	---

Crianças: 0,017 a 0,25mg\kg corpóreo\dia.

CÁPSULAS DE PREDNISONA	Prednisona 5-20mg	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: 5 a 60mg por dia, a critério médico
-------------------------------	----------------------------------	--	--

XAROPE DE PREDNISONA	Prednisona 5mg/ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p. 100ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: <i>Adultos:</i> 5 a 60mg por dia, a critério médico. <i>Crianças:</i> 0,14 a 2mg por kg ao dia, a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;
 Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;
 Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e
 Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

GOTAS DE PREDNISONA	Prednisona 0,07mg\gota Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p. 15ml	Indicação: Condições em que forem requeridos efeitos antiinflamatório e imunossupressor. Ação: Antiinflamatória e imunossupressora.	Posologia: A critério médico.
----------------------------	--	--	---

Crianças: 0,14 a 2,0mg/kg corpóreo\dia.