

Antieméticos em Gel Transdérmica



Prometazina Transdérmica

Cloridrato de Prometazina	50 mg
Água Purificada	4 %
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Mande.....seringas calibradas com 10 ml ou em.....saches monodose com 1 ml.

Modo de Usar: aplicar 0,5 a 1 ml 2 a 3 vezes ao dia ou quando necessário, nos pulsos e atrás das orelhas.

Indicações: náuseas e vômitos após quimioterapia, náuseas decorrentes de viagens.

Obs.: também pode ser formulada em 25 mg/0,2 ml, para facilitar a aplicação (dispensar em seringas de insulina). Guardar em temperatura ambiente.

Ref.: Allen Jr LV (editor). Formulations - Promethazine Hydrochloride 50 mg/ml in PLO gel. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2001 jan/feb;5(1):51.

Ondansetrona Transdérmica

Ondansetrona	8 mg
Água Purificada	20 %
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Mande.....seringas calibradas com 10 ml ou em.....saches monodose com 1 ml.

Modo de Usar: aplicar 1 ml 3 vezes ao dia, nos pulsos e atrás das orelhas.

Indicações: náuseas e vômitos após quimioterapia.

Obs.: guardar em temperatura ambiente. O gel transdérmico PLO tem propriedade gelificante termo-reversa e se liquefaz quando resfriado em geladeira.

Ref.: Allen Jr LV (editor). Formulations - Ondansetron Hydrochloride 8 mg/ml in PLO. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2000 jul/aug;4(4):305.