

# Verrugas Plantares

## Colódio com 5-Fluoruracil

(5)-Fluoruracil	1 a 3 %
Ácido Salicílico	5 a 15 %
Ácido Láctico	5 a 15 %
Colódio Elástico qsp	20 ml

Indicações: verrugas plantares.

Modo de Usar: aplicar 1 vez ao dia, com o auxílio de um cotonete, protegendo a pele ao redor com vaselina sólida.

Ref.: 1. Dogra A, Gupta SK, Bansal A. Comparative efficacy of topical 5% 5-fluorouracil with electrosurgery in treatment of warts. *Indian Journal of Dermatology*. 2006; 51(2):108-110. 2. Salk SS, Grogan KA, Chang TJ. Topical 5% 5-fluorouracil cream in the treatment of plantar warts: a prospective, randomized, and controlled clinical study. *Journal of Drugs in Dermatology*. 2006 may; 5(5):418-24.

# Verrugas Recalcitrantes

## Sulfato de Zinco

Sulfato de Zinco Heptaidratado	200 mg
Excipiente qsp	1 cápsula
Mande.....cápsulas	

Posologia: adultos com 60 kg ou mais - 1 cápsula 3 vezes ao dia; ou 10 mg/kg ao dia divididos em 3 tomadas, até o máximo de 600 mg ao dia.

Indicações: verrugas virais recalcitrantes.

Ref.: Al-Gurairi FT et al. Oral zinc sulphate in the treatment of recalcitrant viral warts: randomized placebo-controlled clinical trial. *British Journal of Dermatology*. 2002;146: 423-431.

## Creme com Cidofovir

Cidofovir	3 %
Creme Excipiente qsp	10 g

Indicações: verrugas resistentes.

Modo de Usar: aplicar 2 vezes ao dia. O estudo relata diminuição do tamanho após 3 dias de uso e cura clínica em 8 semanas.

Ref.: A Review of Topical and Intralesional Cidofovir. Edward J. Zabawski, Jr., *Dermatology Online Journal* 6(1): 3 - Vistide® 75 mg/ml Gilead Sciences (USA).