

VIROSES

VERRUGAS E CONDILOMA ACUMINADO

Uso Tópico:

SOLUÇÃO PIRÚVICA 5FU	5FU 1 - 2% Ácido Pirúvico q.s.p.100% Conteúdo 10ml	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Cáustica e citostática	Uso: Em consultório, sobre restrito controle médico.
-------------------------------------	---	---	--

O **Ácido Pirúvico** é um *Alfahidroxiácido* de alto potencial cáustico. É convertido a partir da forma Keto do Ácido Lático, e vice-versa.

O **5-Fluoracil**, 5FU, é um citostático usado também com o objetivo de interromper a reinfestação viral.

A **Solução Pirúvica 5FU** foi especialmente desenvolvida para o uso restrito em consultório, devendo ser aplicada exclusivamente pelo médico.

Para permitir a penetração tópica dos agentes aplicados, recomenda-se a remoção mecânica da grossa camada calosa que cobre a verruga. A solução deve ser aplicada no centro da lesão, com o auxílio de um pincel. A penetração ocorre bastante rápida através da superfície da verruga. Uma ou mais aplicações são feitas até o paciente sentir uma sensação de queimadura. Aplica-se, então, uma fita adesiva para prevenir o contato da solução com outros lugares. Remover a fita adesiva em poucas horas e lavar o local com água. Dependendo da resposta clínica, o procedimento poderá ser repetido dentro de duas a três semanas. Devido a alta possibilidade de ocorrer epidermólise, deve-se atentar aos possíveis efeitos na derme, maiores que os desejáveis.

SOLUÇÃO PIRÚVICA DE MANUTENÇÃO	5FU 0,5% Ácido Pirúvico e Etanol 1:1 Conteúdo 30ml	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Cáustica e citostática	Uso: A critério médico.
---	--	---	--------------------------------------

No tratamento doméstico das verrugas, o paciente é orientado a aplicar a solução no centro da verruga com o auxílio de um pincel fino, diversas vezes ao dia - a critério médico - no primeiro e segundo dia. As aplicações devem ser suspensas caso o paciente sinta uma distinta sensação de queimadura. Não se fazem aplicações do terceiro ao sétimo dia. Caso não haja uma reação adequada para erradicar a lesão, as aplicações podem ser retomadas.

COLÓDIO COMPOSTO COM ÁCIDO SALICÍLICO	Ácido Salicílico 5g Ácido Lático 1ml Colódio Elástico 25g	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Queratólítica.	Uso: Em consultório.
--	---	---	--------------------------------

COLÓDIO COMPOSTO COM ÉTER SULFÚRICO	Ácido Salicílico 5g Ácido Láctico 2g Éter Sulfúrico 3ml Álcool Etílico 5ml Colódio Elástico 25g	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Queratolítica.	Uso: Em consultório.
--	---	--	--------------------------------

COLÓDIO COMPOSTO COM PODOFILINA	Ácido Salicílico 10g Resina de Podofilina 5-10g Acetona 5g Colódio Elástico 25g	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Cáustica e queratolítica.	Uso: Em consultório. Obs: Evitar na gestação.
--	--	---	--

COLÓDIO COM CANTARIDINA	Cantaridina 0,7% Colódio Elástico q.s.p. 10ml	Indicação: Verrugas e Molusco contagioso. Ação: Vesicante.	Uso: Em consultório. Obs: Evitar na gestação.
--------------------------------	---	---	--

COLÓDIO COM CANTARIDINA E PODOFILINA	Cantaridina 1% Ácido Salicílico 30% Podofilina 2% Colódio Elástico q.s.p. 10ml	Indicação: Verrugas e Molusco contagioso. Ação: Vesicante.	Uso: Em consultório. Obs: Evitar na gestação.
---	--	---	--

A ação lítica da **Cantaridina** não ultrapassa as células epidérmicas, a camada basal permanece intacta e tem um efeito mínimo sobre o estrato córneo. Como resultado disto não há formação de cicatrizes após a aplicação tópica. Foi observado o desenvolvimento de verrugas anulares após o tratamento com **Cantaridina** em alguns pacientes.

COLÓDIO COM BICLORETO DE MERCÚRIO	Bicloreto de Mercúrio 1g Éter 3ml Colódio Elástico q.s.p. 10ml	Indicação: Verrugas. Ação: Anestésica, oclusiva, antisséptica e queratolítica.	Uso: A critério médico. Obs: Evitar na gestação.
--	---	---	---

O **Colódio com Bicloreto de Mercúrio** deve ser passado na verruga e coberto com esparadrapo, deixando por 48 horas. Retirar, então, a crosta e repetir a aplicação até que a verruga desapareça.

TINTURA DE BENJOIM COM PODOFILINA	Resina de Podofilina 25% Tintura de Benjoim q.s.p.100ml	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Cáustica.	Uso: Em consultório. Obs: Evitar na gestação.
--	---	---	--

SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE PODOFILINA	Podofilina 25% Álcool a 96° q.s.p.15ml	Indicação: Verrugas e Condiloma Acuminado. Ação: Cáustica.	Uso: Em consultório. Obs: Evitar na gestação.
--	--	---	--

A aplicação de **Podofilina** causa reação inflamatória aguda e subsequente necrose da área tratada. Deve ser feita em consultório, protegendo a área ao redor da lesão com vaselina. Recomenda-se lavar o local da aplicação após 3 a 4 horas e aguardar uma semana para nova aplicação. Pode causar toxicidade sistêmica quando usada em área extensa por longo período de tempo. Não deve ser usada na gravidez devido aos efeitos teratogênicos.

LOÇÃO COM VERDE BRILHANTE	Verde Brilhante 1g Formalina 10ml Resina de Podofilina 10g Acetona 20ml Álcool a 70° q.s.p.100ml	Indicação: Verrugas. Ação: Antimicótica, cáustica, queratolítica e antiviral.	Uso: 1 vez ao dia.
----------------------------------	--	--	------------------------------

LOÇÃO COM DNCB	Dinitro Cloro Benzeno .. 0,05-0,2% Veículo q.s.p.20ml	Indicação: Verrugas. Ação: Cáustica e imunológica.	Uso: A critério médico.
-----------------------	---	---	-----------------------------------

ÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE	Ácido Nítrico q.s.p.10ml	Indicação: Verrugas. Ação: Cáustica.	Uso: Em consultório.
--------------------------------	---	---	--------------------------------

ÁCIDO TRICLORO-ACÉTICO	Ácido Tricloroacético 10 - 90% Água Destilada q.s.p.15ml	Indicação: Verrugas. Ação: Cáustica.	Uso: Em consultório.
-------------------------------	---	---	--------------------------------

HERPES

Uso Tópico:

LOÇÃO ANTI-HERPÉTICA	Talidomida 0,1% Loção hidroalcoólica q.s.p.20ml	Indicação: Infecções pelos vírus <i>Herpes Simplex</i> e <i>Zoster</i> . Ação: Antivirótica.	Uso: A critério médico.
-----------------------------	---	---	-----------------------------------

ACICLOVIR CREME	Aciclovir 5% Creme base q.s.p.30g	Indicação: Infecções pelo vírus <i>Herpes Simplex</i> , inclusive genital e labial. Ação: Antivirótica.	Uso: 5 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------	---	--	---

O *Aciclovir* é um agente antivirótico altamente ativo in vitro contra o vírus *Herpes Simplex* (VHS), tipos I e II e *Varicella Zoster*.

ACICLOVIR CREME ESPECIAL	Aciclovir 5% Guaçatonga 20% L-Lisina 3% Creme base q.s.p.20g	Indicação: Herpes simples. Ação: Antivirótica e cicatrizante.	Uso: 5 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------------	--	--	---

A *Guaçatonga*, *Casearia Silvestris*, é uma planta da família das Flacurtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano, antipruriginoso e fungicida. Tem sido usada em associação a produtos para o tratamento de aftas, herpes e picadas de insetos.

ACICLOVIR POMADA OFTÁLMICA	Aciclovir 5% Pomada oftálmica q.s.p.10g	Indicação: Tratamento de ceratite por <i>Herpes Simplex</i> . Ação: Antivirótica.	Uso: A critério médico.
-----------------------------------	---	--	-----------------------------------

SOLUÇÃO DE VERMELHO NEUTRO	Vermelho Neutro 0,1% Água Destilada q.s.p.20ml	Indicação: Herpes simples. Ação: Antiinfecçiosa.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------------	--	---	---

SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO	Glutaraldeído 1 - 10% Água Destilada q.s.p.20ml	Indicação: Herpes simples. Ação: Desinfetante e bactericida.	Uso: A critério médico.
---------------------------------	--	---	-----------------------------------

O **Glutaraldeído** é um desinfetante bactericida de ação rápida contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. É também efetivo contra alguns fungos e vírus, como o da Hepatite B e SIDA.

SOLUÇÃO IDU	Idoxuridine 4-40% DMSO q.s. Conteúdo 50ml	Indicação: Herpes. Ação: Antivirótica.	Uso: De 1 a 5 vezes ao dia, a critério médico.
--------------------	---	---	--

IDU POMADA OFTÁLMICA	Idoxuridine 0,5% Pomada oftálmica q.s.p.10g	Indicação: Tratamento de ceratite por <i>Herpes Simplex</i> oftálmica. Ação: Antivirótica.	Uso: De 1 a 5 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	---	---	--

GEL ANTI-HERPÉTICO	Guaçatonga 50% L-Lisina 5% IDU 5% Gel base 20g	Indicação: Herpes simples. Ação: Antivirótica , antimicrobiana e cicatrizante.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------	---	---	---

A **Guaçatonga**, *Casearia Silvestris*, é uma planta da família das Flacurtiaceas, com efeitos cicatrizante, antisséptico, antimicrobiano, antipruriginoso e fungicida. Tem sido usada em associação a produtos para o tratamento de aftas, herpes e picadas de insetos.

LOÇÃO ANTI- HERPÉTICA COM ZN	Sulfato de Zinco 0,25% Água Canforada Saturada..... q.s.p.20ml	Indicação: Herpes simples. Ação: Antisséptica e cicatrizante.	Uso: Até 10 vezes ao dia, a critério médico.
CREME ANTI- HERPÉTICO COM L-LISINA	L-Lisina 1 a 5% Creme base q.s.p.20g	Indicação: Herpes simples. Ação: Profilática.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
CREME COM CAPSAICINA	Capsaicina .. 0,025% Creme Base q.s.p.50g	Indicação: Neuralgia pós-herpética. Ação: Analgésica.	Uso: Até 4 vezes ao dia, a critério médico.

A **Capsaicina** exerce efeito analgésico, diminuindo e prevenindo a reacumulação da substância P, principal mediadora da dor do Sistema Nervoso Periférico para o SNC.

BATON ANTI- HERPÉTICO	Óleo de Melaleuca 10% Baton base q.s.p.3,5g	Indicação: Profilaxia do Herpes. Ação: Antisséptica e cicatrizante.	Uso: A critério médico.
--------------------------------------	--	---	--------------------------------------

O **Óleo de Melaleuca**, substância obtida a partir das folhas da *Melaleuca Alternifolia*, contém cerca de 60% de terpenos, 10% de cineole e terpineol. Exerce atividades bactericida e fungicida.

BATON ANTI- HERPÉTICO ESPECIAL	Óleo de Melaleuca 10% L-Lisina 1% Aciclovir 2,5% Baton base q.s.p.3,5g	Indicação: Profilaxia do Herpes. Ação: Antivirótica, antisséptica e cicatrizante.	Uso: A critério médico.
---	---	--	--------------------------------------

Uso Interno:

ACICLOVIR CÁPSULAS	Aciclovir 200 - 400mg	Indicação: Infecções pelo vírus <i>Herpes Simplex</i> , in- clusive genital e labial. Ação: Antivirótica.	Posologia: Até 5g ao dia, a critério médico.
-------------------------------	--------------------------------------	--	--

O **Aciclovir** é um agente antivirótico altamente ativo *in vitro* contra o vírus *Herpes Simplex* (VHS), tipos I e II e *Varicella Zoster*. É parcialmente absorvido no intestino. A maior parte da droga é excretada inalterada pelos rins. O clearance renal do **Aciclovir** é substancialmente superior ao da creatinina. Doses acima de 5g ao dia exigem uma observação rigorosa do paciente. O Aciclovir é dialisável.

COMPLEXO ANTI- HERPÉTICO	Vitamina B1 100mg Vitamina B6 50mg Vitamina B12 0,3mg Vitamina B2. 5,0mg	Indicação: Neurites pós-herpéticas. Ação: Repositora vitamínica nos estados de carência do Complexo B.	Posologia: Até 4 cápsulas ao dia, a critério médico.
---	--	---	---

CÁPSULAS DE L-LISINA	L-Lisina..... 500mg	Indicação: Na profilaxia do <i>Herpes Simplex</i> . Ação: Supressora do vírus.	Posologia: 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia.
-------------------------------------	------------------------------	--	--

Griffith e a equipe da Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana observaram que doses suplementares do aminoácido L-Lisina exerceram efeito supressor das manifestações clínicas de infecções pelo vírus do Herpes.