



Traçado de eletrocardiograma com reversão de taquicardia supraventricular com manobra do seio carotídeo.

130. LAVAGEM GÁSTRICA

a. INDICAÇÃO

Ingestão de substância tóxica.

b. TÉCNICA

Reservar para casos nos quais é esperado transporte prolongado ou então antes de transferência interhospitalar.

Disponibilizar material de reanimação.

Monitorizar o paciente com cardioscópio e oxímetro de pulso.

Explicar o procedimento para pacientes lúcidos.

Selecionar cateter orogástrico calibroso.

Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça mais baixa que o corpo.

Lubrificar o cateter com geléia de lidocaína a 2%.

Introduzir o cateter orogástrico calibroso.

Utilizar no procedimento 250 ml de solução salina.

Prosseguir com a lavagem até o líquido de retorno se apresentar claro.

Realizar a intubação orotraqueal antes do início do procedimento pacientes com depressão do nível de consciência e risco de aspiração pulmonar.

131. OBTENÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

a. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

Equipamento para antissepsia da pele.

Torniquete.

Espadrapo pré-cortado para fixar o cateter.

Cateter venoso de calibre suficiente para realizar a infusão pretendida.

Frasco de fluido para administração venosa com o equipo de conexão apropriado.