

URTICÁRIA AGUDA (< 6 semanas)

Causas mais comuns: Substancias ingeridas (alimentos/ corantes)

Drogas

Infecções

Tratamento

Urticária sem Anafilaxia Antihistamínico Difenidramina (Benadryl) VO/ IM/ IV
1 mg/ kg/ dose 8/8h máx 100 mg/ dose

Dextroclorofeniramina (Polaramine) VO
1ml/ 5 kg 8/8h
Hidroxizine (Hixizine) VO
1mg/kg/dose 6/6h máx 100mg/dia

Se não houver melhora: VO Prednisona/ Prednisolona 1 mg/kg/dia

IV Hidrocortisona ataque 10mg/kg manutenção 20mg/kg/dia
Metilprednisolona ataque 2mg/kg manutenção 4 mg/kg/dia

Urticária com Anafilaxia/ insuficiência respiratória alta (edema glote) / baixa (broncoespasmo)

- A** Vias Aéreas Permeabilização / IOT/ Cricotireoidotomia
- B** Respiração Oxigenioterapia/ oximetria
- C** Circulação Expansão com infusão de volume (SF 0,9% 20ml/kg em 20 minutos/ repetir 3 x/
Dopamina 5- 20 µg/ kg/min
- D** Drogas Adrenalina (1:1000) 0,01ml/kg SC máx 0,3 ml/kg repetir até 3 x a cada 10 minutos
Fenoterol 1gota/ 5 kg VI máx 10 gotas