

Calendário básico de vacinação infantil (recém-nascidos aos 10 anos de idade)

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS PREVENIDAS
Ao nascer	BCG - ID	dose única	Tuberculose
	Hepatite B (1)	1ª dose	Hepatite B
2 meses	Pentavalente (DTP + Hib + HB)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche e infecções* causada pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B e hepatite B
	Poliomielite inativada	1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Rotavírus humano oral (2)	1ª dose	Gastroenterites por rotavírus
	Pneumocócica 10	1ª dose	Alguns tipos de meningite, pneumonia, otite média aguda, sinusite, bacteremia e sepse
3 meses	Meningocócica C	1ª dose	Meningite tipo C
4 meses	Pentavalente (DTP + Hib + HB)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche e infecções* causada pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B e hepatite B
	Poliomielite inativada	2ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Rotavírus humano oral (3)	2ª dose	Gastroenterites por rotavírus
	Pneumocócica 10	2ª dose	Alguns tipos de meningite, pneumonia, otite média aguda, sinusite, bacteremia e sepse
5 meses	Meningocócica C	2ª dose	Meningite tipo C
6 meses	Pentavalente (DTP + Hib + HB)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche e infecções* causada pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B e hepatite B
	Poliomielite oral	1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Pneumocócica 10	3ª dose	Alguns tipos de meningite, pneumonia, otite média aguda, sinusite, bacteremia e sepse
9 meses	Febre amarela (4)	dose inicial	Febre amarela
12 meses	Tríplice viral	1ª dose	Sarampo, rubéola e caxumba
	Pneumocócica 10	reforço	Alguns tipos de meningite, pneumonia, otite média aguda, sinusite, bacteremia e sepse

Calendário básico de vacinação infantil (recém-nascidos aos 10 anos de idade)

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS PREVENIDAS
15 meses	Tríplice bacteriana	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Poliomielite oral	reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	Meningocócica C	reforço	Meningite tipo C
	Tríplice viral	2ª dose	Sarampo, rubéola e caxumba
4 anos	Tríplice bacteriana	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
10 anos	Febre amarela (4)	Uma dose a cada 10 anos	Febre amarela
CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO INFANTIL			
Menores de 5 anos		Vacina oral de poliomielite	
De 6 meses a menores de 2 anos		Vacina influenza (gripe)	

(1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.

(2) É possível administrar a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).

(3) É possível administrar a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

(4) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela 10 (dez) dias antes da viagem.

(*) Alguns tipos de artrite, epiglote, otite, meningite e pneumonia