

# Aceratum<sup>®</sup>

## peróxido de carbamida



### FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Solução otológica: embalagem contendo um frasco com 10 mL.

#### USO EXTERNO

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução otológica contém:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| peróxido de carbamida .....    | 100 mg |
| veículo (glicerol) q.s.p. .... | 1 mL   |

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O peróxido de carbamida, em contato com as matérias retidas no ducto auditivo libera água oxigenada e uréia, facilitando o desprendimento da rolha de cerume e agindo como antisséptico em casos de infecção localizada no conduto auditivo.

##### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Para a remoção do cerume auricular e cura de infecções localizadas no ducto auditivo como auxiliar no tratamento de otites médias e externas.

##### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

##### ADVERTÊNCIAS

O produto não deve ser ingerido.

##### PRECAUÇÕES

##### Gravidez e lactação

O uso do produto durante a gravidez e período de lactação fica a critério médico.

##### Pacientes Idosos

Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes acima de 65 anos de idade, desde que respeitadas as condições gerais do paciente.

##### Principais interações medicamentosas

Estudos demonstraram que o produto não apresenta interações com outros medicamentos.

##### NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIEMNTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

## COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### Características físicas

Solução límpida e transparente, incolor apresentando aspecto homogêneo.

### POSOLOGIA

Pingar 2 a 5 gotas no canal auditivo, 2 a 4 vezes por dia.

Obs.: A volta (saída ou refluxo) da solução de ACERATUM® após a sua aplicação no ouvido é comum e absolutamente normal. Além de evitá-la ou reduzi-la, o tamponamento do ouvido com algodão auxiliará a remoção dos acúmulos ceruminosos, pois o algodão ficará embebido com o cerume dissolvido.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Com o uso correto do produto, seguindo o item Posologia, não há ocorrências de reações adversas nem de efeitos colaterais.

### O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTA MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não há casos de superdosagem e não existem relatos de efeitos tóxicos graves.

### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0440.0005

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dra. Lauren Lobo Lustosa - CRF-SP nº 27.944

### Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129 - Distrito Industrial - Indaiatuba - SP

C.N.P.J. 33.173.097/0002-74 - Indústria Brasileira



DE30011