

Cetoprofeno e Ciclobenzaprina em Gel Transdérmico

Cetoprofeno 10 % Gel Transdérmico

Cetoprofeno	100 mg
Propilenoglicol	qs
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Cetoprofeno 10 % e Ciclobenzaprina 1 %

Cetoprofeno	100 mg
Ciclobenzaprina	10 mg
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Mande.....seringas calibradas com 10 ml ou em.....saches monodose com 1 ml.

Modo de Usar: aplicar 1 ml do gel no local dolorido ou da lesão, 3 a 4 vezes ao dia.

Indicações: tratamento de processos inflamatórios dolorosos ligados à condições músculo-esqueléticas, fibromialgia e processos reumatológicos (artrite e artrose).

Obs.: se necessário, pode-se prescrever lidocaína na concentração de 20 a 50 mg/ml (2 a 5 %).

Ref.: 1. Oberlander K. Fibromyalgia. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2000 jan/feb;4(1):21-23. 2. Jones, M. The History of Pluronic Lecithin Organogel. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2003 may/jun;7(3):180-3. 3. Allen Jr LV (editor). Formulations - Ketoprofen 10%, Cyclobenzaprine 1% and Lidocaine 5% in Poloxamer. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 1998 mar/apr; 2(2):154.