

LIQUEN

Uso Tópico:

GEL OU CREME ANTI-LÍQUEN	Propionato de Testosterona 1 a 2,5% Gel ou creme base q.s.p.100g	Indicação: Líquens escleroso e atrófico. Ação: Androgênica e anabólica.	Uso: A critério médico.
---	---	--	-----------------------------------

SABONETE LÍQUIDO DE AVEIA	Óleo de Aveia 5% Sabonete líquido base q.s.p.100ml	Indicação: Nos banhos diários. Ação: Umectante.	Uso: A critério médico.
--	---	--	-----------------------------------

A **Aveia** é rica em proteínas, lipídios, carboidratos, Vitaminas B1, B2, B3, Vit. E, Ácido Pantotênico, Sódio, Cálcio, Magnésio, Ferro, Cobre, Fósforo, Enxofre e Cloro. Apresenta características marcadamente dérmicas como emoliente, suavizante, refrescante e protetora da pele.

Vide seção de **ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIPRURIGINOSOS e ANTIEXSUDATIVOS.**

**PIODERMITES
SICOSE
BARBA**

Uso Tópico:

CREME PARA IMPETIGO	Precipitado Branco de Mercúrio 2,5g Cold Cream q.s.p.50g	Indicação: Impetigo. Ação: Antisséptica.	Uso: 2 vezes ao dia.
------------------------------------	--	---	--------------------------------

ÁGUA D'ALIBOUR 10%	Sulfato de Cobre 0,1g 0,1g Sulfato de Zinco 0,35g 0,35g Álcool Canforado 0,1ml 0,1ml Tintura de Açafrão 0,1ml Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Como antisséptico e adstringente. Ação: Antisséptica e adstringente.	Uso: A critério médico.
-----------------------------------	---	--	-----------------------------------

Vide seção de **ANTIBIÓTICOS.**

PERMANGANATO DE POTÁSSIO	KMnO ₄ 1g	Indicação: Dermatites exsudativas. Ação: Antiexsudativa, adstringente e antibacteriana.	Uso: A critério médico. Diluir o(s) papel(éis) em 1 a 4 litros de água no momento do uso.
---------------------------------	----------------------------	--	--

Obs: Os resíduos de coloração de *Permanganato de Potássio* em utensílios podem ser removidos com solução de Tiosulfato de Sódio ou vinagre.

CREME PARA PIODERMITE	Sulfato de Neomicina 1g Cold Cream ou Creme base q.s.p.100g	Indicação: Piodermites. Ação: Antibacteriana.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico. Obs: Pode-se associar: Hidrocortisona...1%
------------------------------	---	--	---

CREME ESPECIAL PARA PIODERMITE	Polimixina B 0,1% Tirotricina 0,05% Creme base q.s.p.100g	Indicação: Piodermites. Ação: Antibacteriana.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------------------	---	--	---

GEL OU LOÇÃO DE CLINDAMICINA	Clindamicina . 1 a 3% Gel ou loção base q.s.p.50g/ml	Indicação: Piodermite e foliculite. Ação: Antibacteriana.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
-------------------------------------	--	--	---

GEL OU LOÇÃO DE ERITROMICINA	Eritromicina .. 2 a 4% Gel ou loção base q.s.p.50g/ml	Indicação: Piodermite e foliculite. Ação: Antibacteriana.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
-------------------------------------	---	--	---

GEL PARA SICOSE	Peróxido de Benzoíla 10,0% Eritromicina 4,0% Mentol 0,5% Azuleno 0,03% Ácido Glicirrízico 1,0% Gel base q.s.p.50g	Indicação: Sicose. Ação: Antibacteriana, antiinflamatória, secativa e esfoliativa.	Uso: A critério médico.
------------------------	---	---	-----------------------------------

O *Ácido Glicirrízico* é um antiinflamatório não-esteróide extraído do alcaçuz

Vide seção de ANTIBIÓTICOS.

(Glicirrizo Glabato). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatórias e antialérgicas.

O **Azuleno**, substância obtida por síntese, quimicamente correspondente ao ciclo-pentaciclohepteno, é um antiinflamatório não-esteróide oriundo da Camomila Romana. Exerce atividade antialérgica, de regeneração tissular além de antiinflamatória.

LOÇÃO PARA SICOSE	Ácido Retinóico 0,025 - 0,5% ou Ácido Retinóico AP 0,0025 - 0,05% Eritromicina 4,0% Loção hidroalcoólica q.s.p.60ml	Indicação: Sicose. Ação: Antibacteriana e queratolítica.	Uso: A critério médico.
----------------------------------	---	--	--------------------------------------

O **Ácido Retinóico**, quando *encapsulado no interior de uma partícula de lipossomas*, produz baixa irritação local e reduz a chance de desativação devido à oxidação. Isto se deve ao nível maior de concentrações da substância na derme. A penetração percutânea do **Ácido Retinóico AP** é duas vezes menor que o convencional.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
ÁCIDO RETINÓICO CONVENCIONAL	ÁCIDO RETINÓICO AP
0,001%	0,0001%
0,01%	0,001%
0,025%	0,0025%
0,05%	0,005%
0,075%	0,0075%
0,1%	0,01%

LOÇÃO ESPECIAL PARA SICOSE	Ácido Retinóico 0,025 - 0,5% ou Ácido Retinóico AP 0,0025 - 0,05% Eritromicina 4,0% Hidrocortisona . 1,0% Loção hidroalcoólica q.s.p.60ml	Indicação: Sicose. Ação: Antibacteriana, antiinflamatória e queratolítica.	Uso: A critério médico.
---	--	---	--------------------------------------

Vide seção de **ANTIBIÓTICOS**.

GEL PARA FOLICULITE	Peróxido de Benzoíla 10,0% Ácido Salicílico 2,0% Enxofre 3,0% Clioquinol 2,0% Frescolat 0,6g Gel base q.s.p.50g	Indicação: Foliculite, sicosose. Ação: Antibacteriana, secativa e esfoliativa.	Uso: A critério médico.
----------------------------	---	---	-----------------------------------

O **Clioquinol** é uma substância antimicrobiana ativa contra um amplo espectro de microrganismos patogênicos, como fungos (*Candida*, *Microsporum*, *Tricofiton*) e bactérias Gram-positivas (estafilococos).

O **Frescolat**, Menthyl Lactate, é um cristal incolor não-irritante que proporciona suave efeito refrescante.

SHAVE-GEL (Gel para o barbear)	Peróxido de Benzoíla 5% Alantoína 2% Azuleno 0,05% Aloe 5% Base especial q.s.p.50g	Indicação: Para o barbear. Ação: Emoliente, antibacteriana e antiinflamatória.	Uso: Distribuir em toda a face previamente umedecida.
--	---	---	---

GEL OU LOÇÃO PÓS-SHAVE (Após o barbear)	Peróxido de Benzoíla 5% Alantoína 1% Azuleno 0,01% Aloe 2% Camomila 2% Hamamélis 2% Cânfora 0,5g Base especial q.s.p.50g	Indicação: Para o pós-barbear. Ação: Emoliente, antibacteriana e antiinflamatória.	Uso: Distribuir em toda a face após o barbear.
---	--	---	--

Vide seção de **ANTIBIÓTICOS**.